



Analyse éclair

Août 2020

Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : sommaire des statistiques annuelles du RCRA, 2018-2019

Le présent document résume les plus récentes statistiques annuelles sur les arthroplasties les plus courantes réalisées chaque année au Canada¹. Il présente les caractéristiques et les tendances au chapitre des hospitalisations, des types d'arthroplasties et des reprises, y compris les principales constatations sur le risque de reprise (pour les patients de 18 ans de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Sur la [page couverture](#) :

- *Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : Statistiques éclair du RCRA, 2018-2019*
- *Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : courbes de risque de reprise du RCRA, 2018-2019*

Écoutez sur le [site Web](#).

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : sommaire des statistiques annuelles du RCRA, 2018-2019*. Ottawa, ON : ICIS; 2020.

Principales constatations : statistiques hospitalières

La demande d'arthroplasties de la hanche et du genou continue d'augmenter. Plus de 137 000 chirurgies sont réalisées chaque année au Canada, entraînant des coûts d'hospitalisation estimés à plus de 1,4 milliard de dollars.

- La demande d'arthroplasties de la hanche et du genou continue d'augmenter. Plus de 137 000 chirurgies sont réalisées chaque année au Canada, entraînant des coûts d'hospitalisation estimés à plus de 1,4 milliard de dollars.
- Les coûts d'hospitalisation pour les arthroplasties de la hanche et du genou ont augmenté de 1,4 milliard de dollars entre 2010 et 2017.

Figure 1

Df,,g'XY'%%\$'\$\$\$'fYdf]gYg'XDUfh\fcdf'Ugh]Yg'XY''U'\UbW\Y'Yh'X i '[Ybc i 'cbh'fhf'Y' YWh ifYg'Yb'&\$%, !&\$%-z'
ce qui représente des coûts d'hospitalisation d'environ 165 millions de dollars.


- Ò}ÁG€FìÉG€FJÀæ`ÁÔæ}æåæÈÁÌÉHÁÃåå^•Áæ!c@|[]|æ•cå^•Ãå^•Á|æ@æ}&@^Ã^cÅ^•Á*^} [^Ã...cæå^}cåå^•Á!^] |å•^•ÉA
&q^•cËeËåå^•Ã&@!^*^i^•Ãçå^•æ}cæé!^ { }|æ&^!Á[^ÃeÁ!...]æ!^!Ã^}^Á|[c@-•^Ãå...beÃå}•cæ||...^ÉA
- ŠæÅå^!...^Á{ [^^} }^Ãå^•Á•...b[^!ÃeÁ|q/f]ææ|Ãç^}Á•[á]•Ãå^•Ã[^!c^Ãå^!...^DÃå^•Ã]ææ^}c•Á^•Ã[}cá•^Ãå^}^Ã&@!^*^i^•Ã^
Ã^•Ã!^] |å•^Ã...cæåç] |^•Ãå^AGA-[å•Ã•^] ...å^*!^ÃeÃ&^||^Ãå^•Ã]ææ^}c•Ã^*^Ã[}cá•^Ãå^}^Ãå}c^!ç^}cå[}Ãå}ææ|Ã
ç|ÉtÃb[^!•Ã&[}c!^ÃHÈJÃb[^!•Ã!^•] ^&cåç^ { }^Ã]cDEÄŠ^•Ã&@!^*^i^•Ãå^Ã!^] |å•^Ã•[}cá*...}...|æ|^ { ^}cÃ]|^•Ã&[{ }]|^Ã^•Ã
^Ã•qæ&&[{ }æ*^}^Ã]cåq^}^Ã]|^•Ã|[}*^Ã]...å[å^Ãå^Ã!...cæà|å•^ { }cÈ
- Š^•Ã&[^c^Ã{ [^^} •Ãåq@ [•]ææ|å•æçå[}Ã^cÃ|å...•Ãæ^Ã{ ...å^&å}•Ã[^!Ã^}^Ã&@!^*^i^•Ãå^Ãå^Ã!^] |å•^Ãç^•Ã&|Ã^}cÃ|Ã^•Ã-Ãå^Ã
!...æå]æçå[}DÃ•q...|Ãçæå^}cÃeÃ] |^•Ãå^ÃFJÃì€ÃÃÈÃ•[åcÃ] |—•Ãå^Ãì€ÃÃÃå^Ã] |^•Ã^*^Ã] [^!Ã^}^Ãæ!c@|[]|æ•cå^Ãå}ææ|Ã
ç] |^•Ãå^ÃFFÃì€ÃÃDEÃ
- Š^•ÃHÃ] |å} &â] æ|^•Ã&^•Ã•^•Ãå^•Ã!^] |å•^Ã•Ãåqæ!c@|[]|æ•cå^Ãå^Ã|æ@æ}&@^Ã^cÅ^•Ã*^} [^Ã...cæå^}cÃ|Ã^•Ãå}~^&cå[}•ÉA
|Ãå^Ãå^•Ã||^ { }cÃæ•^}cå^•Ã^}cÃ|qã}•cæàâ|åc...Ãç, *^!^ÃHDÈ|Š^•Ã&@!^*^i^•Ãå^Ã!^] |å•^Ã^}Ã|æâ•[}Ãåq^}^Ãå}~^&cå[}Ã•[}cÃ
] |å} &â] æ|^ { }cÃæcc|åâ^Ãæ|ÃeÃ^}^Ãå}~^&cå[}Ãå^Ã|æÃ] |[c@-•^Ãæ!cå&^|æâ!^Ã[^Ãå^Ã|æÃ: [}^Ãæ^Ã[^!Ãå^Ã|æÃ] |[c@-•^Ã
Ô^Ãc^}^Ãåq^}~^&cå[}Ã^•cÃæ^•Ã|æÃ!æâ•[}Ã|æÃ] |^•Ã&[^!æ}c^Ã] [^!Ãæ^Ã|Ã|æÃ&@!^*^i^•Ãå^Ã!^] |å•^Ã•^Ã^|Ãçå^}cÃæ••^Ã:
rapidement après la chirurgie initiale².

Figure 3

Principales constatations : analyses des risques de reprise

Cette section examine les plus récentes constatations ayant trait au taux de reprise cumulatif des arthroplasties de hanche et de genou au Canada.

Figure 4 Taux de reprise cumulatif pour les arthroplasties initiales de la hanche et du genou liées à l'arthrose, Canada, 2009-2010 à 2018-2019



Sources

Données provenant du Réseau canadien sur la recherche et l'évaluation en orthopédie (RCREA) et du Réseau canadien sur la recherche et l'évaluation en médecine de la famille (RCERF). Ces données sont issues d'un échantillon national de patients hospitalisés dans les hôpitaux canadiens. Elles sont basées sur les admissions pour chirurgie orthopédique et sont ajustées pour tenir compte des facteurs de risque connus.

Tableau Taux de reprise cumulatif pour les arthroplasties initiales de la hanche et du genou liées à l'arthrose, Canada, 2009-2010 à 2018-2019

Articulation	Années après le remplacement initial	Taux de reprise cumulatif (%)	Intervalle de confiance de 95 %	Nombre de patients à risque*
Hanche	1	1,5	1,0 à 2,0	6 591
	2	2,0	1,5 à 2,5	6 591
	3	2,5	2,0 à 3,0	6 591
	4	3,0	2,5 à 3,5	6 591
	5	3,5	3,0 à 4,0	6 591
	6	4,0	3,5 à 4,5	6 591
	7	4,5	4,0 à 5,0	6 591
	8	5,0	4,5 à 5,5	6 591
	9	5,5	5,0 à 6,0	6 591
	10	6,0	5,5 à 6,5	6 591

Articulation	Années après le remplacement initial	Taux de reprise cumulatif (%)	Intervalle de confiance de 95 %	Nombre de patients à risque*
Genou	1	1,12	À FÉJÉFFÉFI	111AGIG
	2	À FÉJÉ	À FÉJÉFÉJH	1F1A1HF
	3	À GÉII		

- **Arthroplasties partielles de la hanche**

- Le volume d'arthroplasties réalisées par le chirurgien et le **hmdYXYUUh]cb'Xi'Zf a i f** utilisé
à} ' ^ æè^ } cÀ• ^ { A| ^ A! à• ^ ^ Aâ^ A{ ^] | à• ^ EAS^ • A&@i! ^ { * à^ • Aæç^ &A , çæcâ [} A } { } A&& { ^ } c... ^ A] { ... • ^ } cæè^ } cÀ^ } A
lâ• ^ ^ A{] | ^ • A... | ^ ç... A^ ^ A| ^ A&@i! ^ { * à^ • Aæç^ &A , çæcâ [} A&& { ^ } c... ^ Aæ] { —• Aæb^ • c^ { ^ } cÀ• ^ { [} A| qé * ^ A^ cA| ^ A• ^ c^ &A
çæcâ [Aâ^ A{ à• ^ ^ A

Conclusion

Sur les patients et les systèmes de santé². Le sommaire des statistiques annuelles de cette année indique aussi que les infections sont la cause la plus courante des arthroplasties de reprise, une situation en proprement dites¹⁰.

Sur les patients et les systèmes de santé². Le sommaire des statistiques annuelles de cette année indique aussi que les infections sont la cause la plus courante des arthroplasties de reprise, une situation en proprement dites¹⁰.

Sur les patients et les systèmes de santé². Le sommaire des statistiques annuelles de cette année indique aussi que les infections sont la cause la plus courante des arthroplasties de reprise, une situation en proprement dites¹⁰.

Remerciements

AY a VfYg'Xi '7ca]hf'Wcbg i`hUh]Z'Xi 'F7F5'

- Úl...•åå^}cÁKÁÖrÁÒ!å&ÁÓ[@ { ÉATæ}åc[àæ
- Coprésident : Dr'AT&@æ^|áÖ^}åæ!ÉAP[^ç^||^E^&[••^
- Dr'AR[^ÁCE{ å!æ^|cÉAP[^ç^æ^ÉÓ!^}• , å&\
- Dr'AS^*^}ÁCE^ÉAV^!^ÉP^ç^É^cÉSå!åå[!
- M^{me}ÁÓ!å^ÁÖ^T[}^ÉATæ}åc[àæ
- M^{me}ÁÙæ}å!åØ^c@æ{ ÉAO[|[{ åi^ÉÓ!åæ} }å^~^
- M^{me} Carolyn

Annexe : Texte de remplacement pour les figures

Figure 1 : Nombre total d'arthroplasties de la hanche et du genou, Canada, &\$%(!&\$%)`{.&\$%,!&\$%-

Articulation	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Hanche	1 610	1 622	1 617	1 610	1 611
Genou	1 314	1 321	1 315	1 309	1 311

Sources

Les données sont tirées de l'Enquête sur la santé canadienne (ESC), une enquête longitudinale annuelle qui recueille des informations sur la santé physique et mentale, le fonctionnement quotidien et les facteurs sociaux et économiques de la population canadienne. Les résultats sont basés sur une estimation à l'échelle nationale.

:][i fY`&'.HU i I `bcf a U]gfg`gY cb`&| [Y`XDUfh\fcd`Ugh]Yg`XY`U hanche et du genou par 100 000 habitants, selon la province c i ``Y`hYff]hc]fYz`&\$%,!&\$%-

Province ou territoire	Hanche	Genou
Terre-Neuve-et-Labrador	200	GF1

Figure 3 : Causes principales des reprises d'arthroplasties de l'articulation de la hanche et du genou au Canada : Statistiques éclair du RCRA, 2018-2019.

Articulation	Infections	Descellement aseptique	Instabilité
Hanche	Généralement	Fébrile	Fébrile
Genou	Habituellement	Fébrile	Fréquemment

Remarque

Überblick über die Hauptursachen von Reoperationen bei Hüft- und Kniearthroplastiken im RCRA-Statistikbericht 2018-2019.

Sources

Überblick über die Hauptursachen von Reoperationen bei Hüft- und Kniearthroplastiken im RCRA-Statistikbericht 2018-2019.

Causes principales des reprises d'arthroplasties de l'articulation de la hanche et du genou au Canada : Statistiques éclair du RCRA, 2018-2019.

Detailed description of Figure 3: This is a table showing the primary causes of revision arthroplasty for hip and knee joints in Canada. The table has four columns: Articulation, Infections, Aseptic loosening, and Instability. The hip column shows 'Généralement' for infections, 'Fébrile' for aseptic loosening, and 'Fébrile' for instability. The knee column shows 'Habituellement' for infections, 'Fébrile' for aseptic loosening, and 'Fréquemment' for instability.

Articulation	Infections	Descellement aseptique	Instabilité
Hanche	Généralement	Fébrile	Fébrile
Genou	Habituellement	Fébrile	Fréquemment

Références

1. Institut canadien d'information sur la santé. [*Statistiques sur les hospitalisations, les chirurgies et les nouveau-nés, 2018-2019*](#). 2020.
2. Institut canadien d'information sur la santé. [*Reprises précoces des arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : un enjeu touchant la qualité, la productivité et les capacités*](#). 2020.
3. [*Hip, Knee & Shoulder Arthroplasty: 2019 Annual Report*](#)
4. [*New Zealand Joint Registry Twenty Year Report, January 1999 to December 2018*](#)
5. [*How long does a hip replacement last? A 20-year follow-up study*](#)
6. [*The Lancet*](#)
7. [*Manuel de collecte de données sur les mesures des résultats déclarés par les patients : arthroplasties de la hanche et du genou, 2019*](#)
8. [*Panorama de la santé 2019 : les indicateurs de l'OCDE*](#)
9. [*Initiative PaRIS de l'OCDE sur les enquêtes des indicateurs déclarés par les patients : mesures des résultats déclarés par les patients \(MRDP\) pour les arthroplasties de la hanche et du genou — lignes directrices internationales pour la collecte de données*](#)



Renseignements sur les données :

rcra@icis.ca