Table des matières

Appuis 4

Note du Secrétariat de l'OCDE 5

Remerciements 7

Le point de vue des patients — avant-propos 10

Renseignements contextuels 12

Introduction aux MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou 12

Élaboration des lignes directrices 16

MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou — lignes directrices internationales pour la collecte de données 18

Paramètres de collecte de données 20

Fichier minimal 24

Considérations relatives à la mise en œuvre des MRDP et à la collecte de données 34

Collecte de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou : état actuel et futur 43

Annexe 1 : Outils de MRDP 45

Annexe 2 : Outils de MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou utilisés sur la scène internationale 49

$QQH[H /LVWH GH YpULFDWLRQ SRXU O'DSSUREEDWLRQ j O

$QQH[H7H[WH GH UHPSODFHPHQW 54

Références 56

Note du Secrétariat de l’OCDE

La mission de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. L’OCDE offre aux gouvernements un forum inédit où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et chercher des solutions à des problèmes communs. En janvier 2017, les ministres de la Santé des pays membres de l’OCDE ont demandé au Secrétariat de l’OCDE de mener des travaux sur l’établissement de mesures comparatives concernant l’expérience des patients et les résultats des soins médicaux. Ce mandat fait suite aux recommandations formulées par le Groupe de réflexion de haut niveau sur les statistiques de santé (HLRG) que le Comité de la santé de l’OCDE avait formé en 2015. Publié en 2017, le rapport final du HLRG soulignait le besoin de recueillir davantage d’information sur les expériences et les résultats des soins déclarés par les patients afin de mieux surveiller la performance des systèmes de santé et de favoriser l’amélioration continue (OCDE, 2017).

Le Comité de la santé de l’OCDE — c’est-à-dire l’entité centrale qui chapeaute les activités de l’OCDE en matière de santé — a lancé l’initiative PaRIS sur les enquêtes des indicateurs déclarés par les patients en vue de réaliser ce mandat. Cette initiative vise à combler d’importantes lacunes en matière d’information et à établir des points de référence internationaux pour la mesure de la performance des systèmes de santé, telle que déclarée par les patients. L’initiative PaRIS comprend deux volets de travail :

1. Appuyer les pays en vue de l’adoption et de la déclaration d’indicateurs déclarés par les patients dans des domaines cliniques précis : arthroplasties de la hanche et du genou, traitement du cancer du sein et services de santé mentale. Ce volet de travail est orienté par le groupe de travail sur la qualité et les résultats des soins de santé. Ce groupe, dont le mandat comprend l’élaboration et la diffusion d’indicateurs comparatifs internationaux sur la qualité des soins de santé, relève du Comité de la santé de l’OCDE.
2. Élaborer une nouvelle enquête internationale qui permettra de comprendre les résultats des soins et les expériences vécues par les patients dont les besoins sont complexes. L’enquête visera les patients qui sont atteints d’une ou de plusieurs affections chroniques

Le mandat du groupe de travail sur les indicateurs déclarés par les patients pour les arthroplasties de la hanche et du genou consiste notamment à élaborer des indicateurs à partir des données sur les mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) et à promouvoir une méthode uniforme de collecte de données sur les MRDP afin d’optimiser la production de rapports comparatifs entre les pays membres de l’OCDE. Des indicateurs fondés sur les données d’essais pilotes menés dans huit pays volontaires ont été élaborés et mis à l’essai en 2018-2019, et publiés dans le rapport Panorama de la santé 2019 (OCDE, 2019).

Le présent document constitue le deuxième produit livrable du groupe de travail. Il vise à fournir des lignes directrices internationales pour accélérer et uniformiser la collecte de données sur les MRDP relatives aux arthroplasties de la hanche et du genou dans les pays membres et les pays partenaires de l’OCDE. Il sert de ressource aux organismes qui souhaitent recueillir de l’information sur les MRDP en vue de répondre à des besoins régionaux et d’établir des comparaisons internationales.

Le présent document est le fruit d’une collaboration entre l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le groupe de travail de l’initiative PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou.

Remerciements

Le document Initiative PaRIS de l’OCDE sur les enquêtes des indicateurs déclarés par les patients : mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) pour les arthroplasties de la hanche et du genou — lignes directrices internationales pour la collecte de données a été élaboré par le groupe de travail sur les indicateurs déclarés par les patients pour les arthroplasties de la hanche et du genou dirigé par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le groupe de travail compte des participants issus de 13 pays membres, notamment des représentants des patients, des cliniciens, des chercheurs, des experts en MRDP et en mesures psychométriques, des responsables des registres nationaux d’arthroplastie et des représentants des gouvernements. Les membres ont joué un rôle de premier plan en éclairant de leurs conseils l’élaboration, la collecte et la diffusion d’indicateurs déclarés par les patients pour les arthroplasties de la hanche et du genou.

L’ICIS s’est vu confier la responsabilité de mener les recherches et d’animer les discussions de concertation nécessaires à la préparation des présentes lignes directrices. Il a également élaboré les spécifications de soumission de données aux fins de la diffusion pilote de 2019 en s’appuyant sur les conseils des membres du groupe de travail. Les membres du groupe de travail ont également favorisé l’accès aux données présentées dans le rapport Panorama de la santé 2019. Un expert-conseil a éclairé l’utilisation appropriée de tableaux de concordance et rendu possible l’évaluation des tableaux de concordance pour la déclaration d’une seule mesure.

Les personnes ci-dessous ont contribué à l’élaboration des présentes lignes directrices :

Équipe de l’ICIS

- Sunita Karmakar-Hore, chef de projet, Mesures des résultats déclarés par les patients
- Candy Chow, coordonnatrice principale, Mesures des résultats déclarés par les patients
- Julia M. Di Bella, analyste principale, Mesures des résultats déclarés par les patients
- Nicole de Guia, gestionnaire, Registres des remplacements articulaires, Résultats et expériences déclarés par les patients
- Greg Webster, directeur, Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée — président du groupe de travail
- Eric Bohm, président du volet clinique, Comité consultatif du Registre canadien des remplacements articulaires

Le point de vue des patients — avant-propos

Le terme « enquêtes des indicateurs déclarés par les patients » est long, mais son acronyme PaRIS, tiré de l’anglais « Patient-reported indicator surveys », est plaisant.

L’initiative semble donc prometteuse. Mais permet-elle de recueillir l’information dont les patients ont besoin pour faire un choix éclairé? Donne-t-elle un aperçu de la performance des services de santé? Comment s’assurer qu’elle fait les deux?

Les patients souhaitent voir leur qualité de vie s’améliorer. Ils veulent savoir si le traitement envisagé enrichira vraiment leur quotidien : relations sociales et familiales plus épanouies, recours moins fréquent aux soins formels et informels, et capacité de travail accrue ou restaurée (travail rémunéré ou bénévolat, employé ou travailleur autonome). Bref, le traitement se traduit-il par une autonomie financière, une atténuation de la douleur et une dépendance amoindrie aux médicaments?

L’initiative PaRIS a ceci d’important qu’elle met l’accent sur la façon dont les patients perçoivent les soins qu’ils reçoivent. Les services de santé et les systèmes de santé sont ainsi amenés à constater que le fait de placer le patient au cœur des soins améliore les résultats, la performance et la valeur ajoutée pour tous les intervenants actuels et futurs.

Dans un contexte où circulent divers types de renseignements, certains très pertinents et d’autres non, il est essentiel d’établir des lignes directrices pour la collecte de données auprès des patients. La création d’un outil homogène pour recueillir ce type de données dans divers pays permettra de cerner les écarts, les problèmes et les lacunes en matière de prestation de soins, et de trouver les solutions qui s’imposent.

Mais pour permettre aux patients de s’exprimer, il faut utiliser un langage qu’ils comprennent et renoncer au jargon universitaire. Il est dans l’intérêt de tous les intervenants de solliciter la participation des patients à toutes les étapes de la recherche, de la conception et de la mise en œuvre.

Dans un univers en constante évolution, il faut continuellement s’ajuster et faire en sorte que l’information reste pertinente et à jour. Il faut y voir le seul moyen de concrétiser cet objectif louable d’améliorer la santé et la qualité de vie des patients, telle que ceux-ci la définissent.

Joop van Griensven
Président, Alliance Douleur Europe (PAE)
Membre du groupe de travail de l’initiative PaRIS de l’OCDE sur les arthroplasties de la hanche et du genou

Dave deBronkart

Blogue « e-Patient Dave », États-Unis
Membre du groupe de travail de l’initiative PaRIS de l’OCDE sur les arthroplasties de la hanche et du genou

Tableau 1 Utilisation des MRDP

Intervenants	Utilisation
Responsables de l'élaboration des politiques et gestionnaires du système de santé	• Comparer les résultats à l'échelle locale, nationale et internationale et au fil du temps • Repérer les variations dans la qualité des soins et les chefs de file en matière de pratiques exemplaires à des fins d'apprentissage mutuel • Évaluer et orienter les initiatives d'amélioration de la qualité • Comparer les différents modèles de soins et cheminements cliniques à des fins d'analyse des résultats • Prendre des décisions sur la répartition des services de santé qui sont éclairées par le coût relatif de l'atteinte des résultats attendus (soins fondés sur la valeur) • Orienter les programmes, les activités de planification et les politiques en matière de services de santé
Organismes de soins de santé	• Surveiller la performance des organismes et des fournisseurs, établir des comparaisons avec des organismes semblables, repérer les organismes qui obtiennent des cotes élevées à des fins de collaboration et d'apprentissage • Repérer et mobiliser les fournisseurs susceptibles de tirer parti d'un soutien supplémentaire
Fournisseurs de soins de santé	• Tirer parti de la rétroaction directe qui peut servir à modifier le cheminement thérapeutique et à fournir des données probantes pour l'amélioration des soins ou le maintien de soins de haut niveau • Renforcer la communication entre les patients et les cliniciens et sensibiliser davantage à des problèmes autrement non discernables • Favoriser les comparaisons en matière de performance et les initiatives d'amélioration de la qualité
Patients	• Permettre aux patients de faire connaître leur point de vue, d'être au fait des résultats attendus et de faire des comparaisons • Permettre aux patients de faire connaître leur point de vue indépendamment de celui du fournisseur et de reconnaître qu'un résultat n'est pas satisfaisant • Améliorer la communication avec les fournisseurs de soins, renforcer la participation des patients à la planification des soins et à la prise de décisions, signaler aux fournisseurs de soins des problèmes Tp 447>>BDC BT 9 e ETTpDl a1AaC BT 9 0 0 9 168.479995727 355.988311767en r

Élaboration des lignes directrices

Le vif intérêt que suscite l’utilisation des MRDP dans divers pays a motivé l’élaboration d’une méthode normalisée pour comparer les données avec justesse à l’échelle internationale. Ce niveau d’analyse et de déclaration permet de surveiller la performance des systèmes de santé des pays membres de l’OCDE et de relever les variations touchant la qualité des soins à des fins d’apprentissage mutuel. En 2015, le Consortium international pour la mesure des résultats de santé (ICHOM) a publié un guide de référence sur l’arthrose de la hanche et du genou dans l’objectif de faciliter la collecte de données comparables aux fins d’établissement de points de référence internationaux et d’apprentissage (ICHOM, 2015). Cet objectif cadre avec l’initiative PaRIS. Toutefois, le guide de l’ICHOM englobe les patients aux prises avec l’arthrose, tandis que les activités du groupe de travail de l’initiative PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou (le groupe de travail) ne portent que sur les patients qui subissent ces interventions. En 2016, le groupe de travail sur les MRDP de la Société internationale des registres d’arthroplastie (ISAR) a par ailleurs formulé des recommandations en matière de pratiques exemplaires des MRDP relatives aux arthroplasties de la hanche et du genou (Rolfson, et al., 2016). Des membres de l’ICHOM et de l’ISAR ont donc été invités à participer au groupe de travail afin de mettre à contribution leurs connaissances et leur expérience à ce chapitre.

Le groupe a longuement réfléchi aux méthodologies qui mèneraient à une collecte rigoureuse de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou et à la production de rapports comparatifs, tout en maximisant le nombre de pays en mesure de participer aux activités de déclaration. Il a effectué un examen de la littérature, une analyse environnementale et des consultations, et a tenu des discussions en vue de définir les présentes lignes directrices. L’examen des outils de MRDP existants visait notamment à évaluer leurs propriétés psychométriques (comme la fidélité, la validité et la sensibilité), leur applicabilité dans le contexte des soins et des systèmes de santé, la participation des patients aux activités d’élaboration, le fardeau de la collecte, les traductions et validations effectuées, les licences et les coûts, et l’utilisation des outils dans le cadre des programmes existants. Les algorithmes, ou tableaux de concordance, utilisés pour convertir les cotes tirées de divers outils en une mesure comparable ont également fait l’objet d’une recherche et d’une évaluation.

MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou — lignes directrices internationales pour la collecte de données

Les présentes lignes directrices fournissent aux programmes de MRDP actuels et nouveaux de l’information sur la collecte des MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou.

Éléments		Recommandations
Outil général		Aucune recommandation n'a encore été formulée (en attente d'un consensus à l'échelle des groupes cliniques de l'initiative PaRIS)
Outils propres à une affection		Outils privilégiés : outil OHS (score d'Oxford pour la hanche) et OKS (score d'Oxford pour le genou) Autres outils : il est possible d'utiliser les outils HOOS (Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score) et KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) si les outils OHS et OKS ne peuvent être adoptés en raison de contraintes d'ordre local
Éléments individuels	État de santé général	Question : En général, diriez-vous que votre état de santé est… Réponses : Excellent; Très bon; Bon; Passable; Mauvais
	Satisfaction	Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des résultats de votre remplacement [de la hanche/du genou] du côté [gauche/droit]? Réponses : Très insatisfait; Insatisfait; Neutre; Satisfait; Très satisfait
	Douleur Pour les programmes qui n'utilisent pas les outils OHS et OKS	Question : Au cours des quatre dernières semaines, comment décririez-vous la douleur [à la hanche/au genou] que vous ressentez habituellement? Réponses : Aucune; Très légère; Légère; Modérée; Sévère
	Fonctions physiques Pour les programmes qui n'utilisent pas les outils OHS et OKS	Question : Pendant combien de temps avez-vous pu marcher (avec ou sans canne) avant que votre douleur [à la hanche/au genou] devienne grave? Réponses : Aucune douleur/plus de 30 minutes; 16 à 30 minutes; 5 à 15 minutes; Autour de la maison seulement; Pas du tout/Douleur sévère en marchant
Renseignements sur le patient		• Date de naissance • Sexe • Identificateur unique du patient

Méthodes de collecte

Les méthodes de collecte peuvent comprendre les questionnaires papier, téléphoniques et électroniques. La méthode de collecte choisie influe sur la mise en œuvre et un certain nombre de facteurs opérationnels, notamment le fardeau qui incombe aux patients et au personnel administratif, l’actualité et la qualité des données et l’accès à celles-ci.

Ligne directrice internationale

- Il est recommandé de recourir à des questionnaires électroniques (étalon de référence) pour la collecte des MRDP. Les questionnaires papier sont utilisés en guise de complément et en cas de besoin, par exemple pour respecter les préférences du patient.

Justification

- Les questionnaires électroniques peuvent être plus efficaces et efficients à long terme que les questionnaires papier et téléphoniques, et permettent d’accéder plus rapidement à l’information. En plus d’alléger le fardeau de la collecte de données et des activités de suivi qui incombe au personnel, les questionnaires électroniques améliorent la qualité des données et ont le potentiel de réduire le fardeau pour les répondants (grâce à des tests adaptatifs informatisés).

Considérations d’ordre local

Les questionnaires papier peuvent alourdir le fardeau du personnel et accroître les coûts à long terme, mais leur mise en œuvre est souvent plus rapide, facile et économique que celle des autres méthodes de collecte. Il se peut donc que certains programmes commencent par des questionnaires papier, même si ce n’est pas la méthode de collecte privilégiée.

Population de patients

La population de patients ciblée par la collecte de données varie en fonction des objectifs du programme de MRDP. La ligne directrice qui suit a été élaborée dans le but précis de favoriser la production de rapports comparatifs à l’échelle internationale.

Ligne directrice internationale

Fichier minimal

Le fichier minimal inclut les outils de MRDP recommandés, les éléments individuels, les renseignements sur le patient, l’information clinique et les renseignements relatifs au sondage qui sont nécessaires à la déclaration.

Outils de MRDP

En règle générale, il est recommandé d’utiliser à la fois un outil de MRDP général H W X Q R X W L O G H 0 5 ' 3 S U R, Scar deux-X QuHstionnaires de WRPS) et un outil de MRDP spécifique à l’affection (ou à l’intervention) qui fournissent de l’information complémentaire et répondent à des besoins en information différents (voir le tableau 2). Divers outils ont été adoptés jusqu’à maintenant dans les diverses régions du monde. L’annexe 1 présente les outils de MRDP les plus souvent utilisés pour les patients ayant

Au moment de la rédaction du présent document, l’EQ-5D était l’outil général le plus couramment utilisé dans le cadre des grandes initiatives nationales de collecte de MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou. En plus d’être très court et de permettre le calcul des années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) aux fins d’une éventuelle

Outils propres à une affection

Ligne directrice internationale

- Il est recommandé d'utiliser les outils OHS (Oxford Hip Score) et OKS (Oxford Knee Score) comme outils propres à une affection dans le cadre de la collecte de données.
- Si ce n'est pas possible en raison de contraintes d'ordre local, on peut utiliser les outils HOOS (Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score) et KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), mais la comparabilité des résultats à l'échelle internationale s'en verra limitée.
- Il est recommandé de mener des consultations auprès des intervenants locaux pour orienter le choix d'un outil.

Justification

- Les outils OHS et OKS sont les outils propres à une affection les plus souvent adoptés par les programmes nationaux et régionaux de collecte régulière de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou. Ils sont privilégiés en raison de leur brièveté et du fait qu'ils sont conçus pour les patients qui subissent ce type d'intervention (même s'ils s'appliquent à toutes les manifestations de l'arthrose). Au moment de la rédaction du présent document, l'utilisation des outils Oxford exigeait une licence, mais n'entraînait aucuns frais pour les utilisateurs qui s'en servaient à des fins non commerciales (des frais pour l'examen des versions électroniques pouvaient toutefois s'appliquer).
- Les outils HOOS et KOOS occupent le deuxième rang des outils les plus courants. Ils étaient libres de droits au moment de la rédaction du présent document et n'exigeaient aucune licence d'utilisation.

Considérations

L'annexe 1 décrit les outils de MRDP courants qui ont fait l'objet d'un examen par le groupe de travail. L'OHS et l'OKS, de même que le HOOS et le KOOS, sont des outils valides que l'on utilise depuis longtemps pour les arthroplasties de la hanche et du genou. S'il n'y a pas adoption par consensus d'un outil, il faut alors convertir les résultats en fonction d'une échelle de mesure unique — par exemple au moyen d'un algorithme de mise en correspondance — aux fins des comparaisons internationales. Comme aucun tableau de concordance de ce type n'a encore été validé, les résultats provenant de différents outils propres à une affection

ne peuvent être comparés à l’échelle internationale. L’initiative PaRIS vise donc à stimuler la recherche en la matière. Les lignes directrices ci-dessus peuvent être envisagées comme un processus provisoire, en attendant que des travaux de recherche soient menés pour intensifier la comparabilité internationale ou qu’un outil fasse l’objet d’un usage généralisé par suite d’initiatives d’uniformisation et d’adoption d’outils de MRDP.

Il est à souligner qu’il existe aussi des versions plus courtes des outils HOOS et KOOS

Renseignements sur le patient

Les renseignements sur le patient (p. ex. les données démographiques) peuvent provenir du patient lui-même ou, idéalement, de sources administratives. En cas de collecte électronique, il convient d’envisager la saisie automatique de ces champs de façon à réduire le fardeau qui incombe au patient ou au personnel. L’identificateur unique du patient permet d’établir un lien entre les patients, les interventions et les sondages. Il permet aussi de coupler les données sur les MRDP et les renseignements contenus dans les données clinico-administratives et de registres (ce qui favorise la saisie de l’information au moyen de diverses sources) dans la mesure où l’infrastructure d’information en place ou, plus précisément, l’interopérabilité des systèmes de données est suffisante.

Ligne directrice internationale

- Le fichier minimal devrait permettre la collecte des trois éléments de données suivants :
  - Date de naissance
  - Sexe
  - Identificateur unique du patient

Justification

- Ces éléments sont essentiels aux activités de déclaration (p. ex. critères d’inclusion et d’exclusion, ajustement des groupes clients). Ils permettent également le couplage de données à l’échelle de plusieurs questionnaires sur les MRDP (pour un même patient) ou avec d’autres sources-r>0x.951(e)15oév5(c)8tautr

Réalisation du sondage

Idéalement, les champs relatifs à la réalisation du sondage seraient alimentés au moyen de processus automatisés. Les renseignements sur le sondage permettent de distinguer et de coupler plusieurs sondages remplis par un même patient.

Ligne directrice internationale

- Le fichier minimal devrait permettre la collecte des cinq éléments de données suivants :
  - Identificateur du sondage (enregistrement)
  - Date du sondage

Information clinique

Idéalement, les champs relatifs à l’information clinique seraient alimentés au moyen de processus automatisés ou d’un couplage de données — dans la mesure où l’interopérabilité des systèmes est suffisante.

Ligne directrice internationale

- Le fichier minimal devrait permettre la collecte des éléments de données suivants :
  - Date de l’intervention
  - Type d’articulation (hanche, genou)
  - Côté de l’articulation (droit, gauche, bilatéral)
  - Étendue de l’arthroplastie (totale, partielle)
  - Type d’arthroplastie (initiale, reprise)
  - Niveau d’urgence de l’intervention (très urgente, non urgente)
  - Diagnostic principal
  - Identificateur du chirurgien
  - Identificateur de l’établissement
  - Indice de masse corporelle
  - Collecte des facteurs de comorbidité [diagnostics distincts, score ASA (classification de l’état physique) — voir les considérations ci-dessous]

Justification

- Ces éléments sont essentiels aux activités de déclaration (p. ex. critères d’inclusion et d’exclusion, ajustement des groupes clients, interprétation et analyse des données).

Considérations

) D F W H X U V G H F R O O H F W H U G H V U H Q V H L J Q H P H Q W V V X U O H V F R P S R U W H P H Q W V G H V D Q W ¬ G H V S D W L H Q W V G H F R P R U E L G L W ¬ G H V S D W L H Q W V ¬ F D U F H X [² F L S H U P H W W H Q W G ¶ H I I H F W X H U X Q D M X V W H P H Q W V H O R Q O H V U L V T X H V H Q Y X H ¬ Q R W D P P H Q W G H O ¶ L Q W H U S U ¬ W D W L R Q G H V U ¬ V X O W D W V ¬ ¬ F K H O O H G H G L Y H U V I R X U Q L V V H X U V G H V R L Q V H W G H G L Y H U V H V D X W R U L W ¬ V F R P S ¬ W H Q W H V ¬ R Q Q R P E U H G H S U R J U D P P H V U H F X H L O O H Q W G H V U H Q V H L J Q H P H Q W V V X U O H V I D F W H X U V G H F R P R U E L G L W ¬ V R X V I R U P H G H G L D J Q R V W L F V G L V W L Q F W V ¬ S U ¬ F L V L R Q Y D U L D E O H ¬ & K D T X H ¬ W D W P R U E L G H S H X W G R Q F ¬ W U H D M X V W ¬ V H O R Q O H V U L V T X H V ¬ D X P R \ H Q G ¶ D Q D O \ V H V P X O W L Y D U L D E O H V R X G H U H Q V H L J Q H P H Q W V G ¬ U L Y ¬ V F R P P H O ¶ L Q G L F H G H &K D U O V R Q (W D O ¬ ¬ Q O ¶ D E V H Q F H G H U H Q V H L J Q H P H Q W V

Considérations relatives à la mise en œuvre des MRDP et à la collecte de données

La réussite de la mise en œuvre des MRDP repose sur plusieurs facteurs, comme en témoigne la figure 1.

Figure 1 Considérations relatives à la mise en œuvre et à la collecte de données



Principales considérations :

- Mobiliser un large éventail d'intervenants tout au long de la mise en œuvre des MRDP et de la collecte de données, de manière à favoriser la participation et à promouvoir la valeur des MRDP
- Définir clairement les objectifs de la collecte de MRDP et les façons d'utiliser les données
- Assurer la gestion des MRDP, y compris de l'infrastructure et des ressources nécessaires à la collecte de données
- Tenir compte des exigences relatives aux licences d'utilisation des outils de MRDP
- Utiliser un modèle de collecte de données qui réduit au minimum le fardeau de la collecte et maximise le taux de réponse ainsi que l'actualité et la qualité des données
- Connaître les lois sur le respect de la vie privée et la sécurité, notamment les dispositions relatives à la collecte de données auprès des patients et au partage des données à des fins de déclaration à l'échelle locale et internationale
- Convenir de méthodes communes de collecte des MRDP pour renforcer l'efficacité, réduire le chevauchement et assurer la comparabilité des données utilisées pour les rapports et l'établissement de points de référence

La liste de vérification pour la préparation à la mise en œuvre présentée à l'annexe 3 énumère les points à prendre en compte lors de la planification des programmes de MRDP. Elle peut être utilisée de pair avec les lignes directrices énoncées dans le présent document.

Participation des intervenants

Comme le démontre la figure 1, la réussite d'une vaste initiative de collecte de MRDP repose d'abord sur la participation et le soutien d'intervenants évoluant à divers échelons du système de santé. Elle suppose la mobilisation des membres du milieu clinique (ce qui comprend les administrateurs tels que les coordonnateurs en soins infirmiers et les gestionnaires de clinique), des patients et des décideurs du système de santé. L'appui des responsables en milieu clinique favorise l'adoption du programme par les chirurgiens, les équipes de soins et les patients, et contribue à promouvoir la valeur des MRDP dans le cadre des soins de routine (Chenok, et al., 2016).

La collecte de MRDP repose aussi sur la participation des patients et du personnel clinique. Idéalement, les MRDP seraient intégrées aux processus cliniques et examinées par le patient dans le cadre de la prestation des soins avant et après l’intervention. Il est par ailleurs nécessaire d’obtenir le soutien des responsables de l’élaboration des politiques pour assurer le déploiement des ressources appropriées et démontrer que la collecte et l’utilisation des MRDP ont été définies comme des priorités du système de santé. Il convient de mobiliser les intervenants de tous les échelons, en mettant en relief la valeur ajoutée de la collecte de MRDP, et de solliciter l’aide des patients et du personnel clinique pour élaborer des ressources visant à promouvoir et à sensibiliser les patients, les cliniciens et les décideurs du système de santé à la collecte et à l’utilisation des MRDP.

Objectifs de la collecte

Dans le cadre de l’élaboration d’une initiative de MRDP, il convient de fixer les objectifs du programme et de définir les façons dont les données seront utilisées (voir le tableau 1), puisque ceux-ci auront une incidence sur d’autres aspects importants de la collecte. Par exemple, pour choisir un outil de MRDP, il faut d’abord prendre des décisions au sujet du concept à mesurer (p. ex. les domaines et les objectifs visés). Certains outils conviennent davantage à la production de mesures de l’utilité qui permettront une analyse coût-efficacité, tandis que d’autres génèrent des cotes de profil ou des cotes normatives qui peuvent être plus utiles pour l’évaluation du programme et la surveillance des services de santé. L’utilisation des données sur les MRDP influera également sur les décisions liées à la gestion du programme de MRDP. Par exemple, pour mesurer l’efficacité d’une intervention, il faudra recueillir des données sur les MRDP avant et après l’intervention, tandis que pour évaluer la

Réalisation, collecte de données, ressources et infrastructure

Dans un contexte de mise en œuvre durable, il faut veiller à restreindre les répercussions du programme de MRDP sur les processus cliniques, à alléger le fardeau qui pèse sur les patients et les fournisseurs de soins et à limiter les ressources indispensables à la collecte de données, tout en maximisant les avantages que procure le programme. L’adoption d’une démarche concertée et coordonnée à l’échelle de tous les programmes permet d’en optimiser les avantages.

Utilisation d’outils de MRDP

Certains outils sont libres de droits et ne requièrent aucune licence d’utilisation, alors que d’autres en exigent une. Certains outils sous licence imposent des frais, selon l’utilisation qu’on en fait — dans certains cas, aucuns frais ne sont exigés si les données sont recueillies à des fins non commerciales ou dans le cadre des soins de routine. Parfois, les outils exclusifs supposent aussi des restrictions d’utilisation dont il faut tenir compte. Si les outils

Méthode de collecte

La collecte de données par voie électronique est souvent plus efficace, efficiente et avantageuse que le recours à des questionnaires papier ou téléphoniques (De Faoite, 2018). L'utilisation d'outils technologiques, comme des formulaires Web et des applications mobiles, peut réduire le fardeau de la collecte qui incombe au personnel et aux patients, ce qui se traduit souvent par des taux de réponse plus élevés, une meilleure qualité des données et un accès plus rapide à l'information (Chenok, et al., 2015). Quand l'infrastructure le permet, il est possible de greffer les MRDP recueillies par voie électronique au dossier de santé électronique (DSE) du patient. Les données sont ainsi accessibles aux fournisseurs de soins dans l'ensemble du continuum des soins et s'intègrent facilement aux autres sources de données administratives à des fins d'analyse. Comme les MRDP qui figurent dans le DSE sont accessibles au patient, elles améliorent en outre la communication entre les patients et les fournisseurs de soins et éclairent la prise de décisions (Wagle, 2016). L'interopérabilité des systèmes est essentielle. En favorisant l'accès aux données, la saisie automatique de certains champs et le couplage avec des données provenant d'autres sources, elle permet en effet de tirer le meilleur parti de la collecte électronique. Il est possible d'assurer l'interopérabilité des systèmes en s'appuyant sur les normes internationales qui régissent la codification des soins de santé (p. ex. la norme FHIR de HL7). Enfin, il faut également évaluer le fardeau imposé au personnel. Si le programme opte pour des questionnaires papier ou téléphoniques, il doit prévoir les ressources nécessaires à la collecte et à la saisie des données. Il convient en outre de privilégier les méthodes de codification par les patients, car des études révèlent que certaines méthodes de collecte induisent des biais d'acquiescement significatifs (Cabitza et Dui, 2019).

Moments du sondage

Même si les MRDP peuvent être recueillies à divers moments dans le cheminement thérapeutique, il faut choisir les moments de collecte avec soin, en portant une attention particulière au fardeau qu'ils imposent au personnel et aux patients. Les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou sont habituellement recueillies avant et après l'intervention. Pour que l'efficacité du système de santé puisse être évaluée adéquatement, la deuxième collecte doit avoir lieu une fois le patient complètement rétabli (en principe, 12 mois après l'intervention). À ces deux moments de collecte peuvent s'ajouter d'autres activités de sondage visant à répondre aux besoins informationnels d'ordre local. En Suède par exemple, on recueille des données un an, 6 ans et 10 ans après l'intervention afin de pouvoir évaluer les résultats à long terme de l'intervention (Rolfson, et al., 2011). Ailleurs, les sondages post-intervention sont parfois réalisés selon un délai et une fréquence plus

Un mécanisme doit être mis en place pour l’enclenchement des processus de collecte et de suivi, surtout si les moments de collecte ne coïncident pas avec les rendez-vous médicaux des patients. Les plateformes électroniques se révèlent probablement les moins coûteuses à cet égard, puisqu’il suffit de programmer l’envoi automatisé de rappels par courrier électronique. Un suivi efficace peut être un gage de succès si la mesure de l’efficacité des interventions du système de santé figure parmi les objectifs du programme de MRDP. Il est donc essentiel d’instaurer un mécanisme capable d’assurer un suivi efficace et d’engendrer un taux de réponse élevé.

Ressources et infrastructure nécessaires à la mise en œuvre et à la collecte continue de MRDP

L’adoption d’une méthode commune de collecte des MRDP peut s’avérer efficace et efficiente, et optimiser les avantages en aval

Couplage des données

L'identificateur unique du patient permet de coupler les MRDP avec des données clinico-administratives pertinentes tirées d'autres sources. L'infrastructure envisagée aux fins du programme doit donc permettre ce couplage de manière à appuyer la prestation de soins axés sur le patient et fondés sur la valeur. Les lois et règlements en matière de couplage de données doivent également être pris en compte. Le couplage des données remplit deux grandes fonctions :

- éviter la collecte de données supplémentaires à des fins d'analyses descriptives;
- ajuster les groupes clients selon les données administratives disponibles, ce qui est recommandé pour obtenir des comparaisons utiles à l'échelle des régions et des fournisseurs de soins.

Il faudra peut-être étendre la collecte à d'autres éléments de données (p. ex. à des variables de groupes clients) si l'information obtenue par couplage de données ne permet pas de répondre aux besoins d'ordre local. Le cas échéant, il faut choisir des éléments de données pertinents, qui fournissent des renseignements sur l'état de santé, les soins et le rétablissement du patient, de manière à minimiser le fardeau de la collecte pour les patients et les cliniciens. Il convient d'atteindre un juste équilibre entre la collecte de données pertinentes et la longueur du sondage. Les patients ne doivent pas se sentir submergés par un trop grand nombre de questions.

Respect de la vie privée et cadre juridique

Les questions de respect de la vie privée et de cadre juridique concernent toutes les initiatives de collecte de données, en particulier la collecte de données déclarées par les patients. La plupart des pays et des régions ont adopté un ensemble exhaustif de lois et de règlements en matière de protection des renseignements personnels sur la santé. Ces lois et règlements établissent le cadre juridique qui régit la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé dans le contexte des MRDP. Les activités de collecte et de partage de données réalisées dans le cadre du programme de MRDP doivent satisfaire aux exigences locales en matière de respect de la vie privée et de sécurité. De manière générale, le partage de données par-delà les frontières aux fins des rapports de l'OCDE vise habituellement des données agrégées ou, en de rares occasions, des données au niveau de l'enregistrement grandement dépersonnalisées. Globalement, il serait judicieux de prendre conseil à ce chapitre (p. ex. auprès des organismes ou des conseils qui réglementent la collecte de données) pour s'assurer que les activités de collecte et de partage de données sur les MRDP cadrent avec les exigences. Dans la mesure du possible, il faudrait chercher à obtenir ces conseils avant le début de la collecte afin de pouvoir établir immédiatement les possibilités de partage et de faciliter les demandes de données.

Gouvernance et utilisation des données

L’entreposage, la gestion, la gouvernance et l’utilisation des données sont des volets importants du programme de MRDP. C’est pourquoi ils doivent faire l’objet d’une planification. La gouvernance des données joue un rôle de premier plan au chapitre de la gestion, de la qualité des données, de l’accès, de la sécurité et de l’évolution du programme. L’adoption de principes rigoureux en matière de gouvernance de données assure l’uniformité, la facilité d’utilisation et la réutilisation des données, maximise les gains d’efficacité opérationnelle, permet de gérer les coûts et simplifie les activités aux fins d’analyse et de production de rapports (OCDE, OECD/LEGAL/0433).

Production de rapports et établissement de points de référence

La production de rapports sur les MRDP peut servir à répondre à des besoins informationnels à l’échelle locale ou à établir des comparaisons et des points de référence à l’échelle nationale et internationale. Par exemple, des rapports contenant des données agrégées peuvent être remis aux patients afin de les aider à définir leurs attentes ou à prendre des décisions à l’égard des options thérapeutiques. Des rapports peuvent également être produits dans le but de comparer les résultats dans l’ensemble du système de santé (y compris à l’échelle des établissements, des régions, des pays et de l’ensemble des pays), de manière à pouvoir cerner les pratiques exemplaires et à favoriser l’amélioration de la qualité. Les mesures et les rapports doivent être élaborés en fonction des observations formulées par les intervenants. Ils seront ainsi pertinents et exploitables dans un contexte clinique et aux fins d’évaluation du système de santé.

L’OCDE diffuse périodiquement des indicateurs comparables à l’échelle internationale qui rendent compte de la performance des systèmes de santé. Dans l’objectif d’assurer la comparabilité des MRDP à l’échelle internationale, les membres du groupe de travail de l’initiative PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou (qui sont des intervenants de la communauté internationale) ont convenu des indicateurs qui feront l’objet d’une diffusion dans les rapports internationaux.

Dans le rapport Panorama de la santé 2019 de l’OCDE, les indicateurs calculés à partir des mesures déclarées par les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche ou du genou sont axés sur les différences entre les cotes qui ont été générées avant et après l’intervention, à l’aide des outils généraux et des outils propres à une affection, normalisées selon l’âge, le sexe et la cote avant l’intervention. La méthodologie d’ajustement selon les risques n’a pas tenu compte des facteurs de comorbidité, puisque la collecte de cette information à

l’échelle de tous les programmes soulève des difficultés en ce moment. Le recours à l’indice de Charlson ou à la classification de l’état physique de l’ASA pourrait être envisageable si un nombre accru de programmes les intègre à leurs systèmes d’information.

Les comparaisons internationales se limitent actuellement aux programmes qui utilisent les mêmes outils ou qui utilisent des outils pour lesquels il existe des tableaux de concordance. Toutefois, l’adoption de normes internationales communes pourrait renforcer la comparabilité et la fiabilité des données sur les MRDP à l’échelle internationale.

Collecte de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou : état actuel et futur

Comme c’est le cas pour toutes les nouvelles initiatives de collecte de données — en particulier celles intégrant des données déclarées par les patients — la mise en œuvre d’un programme de MRDP durable est complexe et exigeante en ressources : il faut y consacrer beaucoup de temps, d’efforts et de fonds. Bon nombre de programmes existants de MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou recueillent des données à l’aide d’outils de MRDP généraux et propres à une maladie traditionnels qui fournissent de l’information complémentaire sur laquelle appuyer de nombreuses décisions touchant le système de santé. Or, de nouvelles méthodes ont été mises au point, comme le recours à des banques d’items et à des tests adaptatifs informatisés. Leur mise en œuvre s’accélère dans les milieux cliniques, ce qui témoigne du dynamisme et de l’évolution du contexte d’utilisation des MRDP.

Les banques d’items permettent de peaufiner la gestion des MRDP. Elles renforcent la validité tout en réduisant le fardeau qui incombe au patient, c’est-à-dire le nombre de questions auxquelles il doit répondre. Les questionnaires fondés sur les banques d’items issues du modèle de réponse d’item sont plus intéressants que les outils de MRDP traditionnels à plusieurs égardsl1>>Berwee,9L

Quoi qu’il en soit, le recours aux banques d’items est plus fréquent dans les milieux de recherche que dans les milieux cliniques en ce moment, probablement en raison des coûts

Annexe1 : Outils de MRDP

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des outils de MRDP généraux et propres à une affection qui ont fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’initiative PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou.

Tableau 4 Outils généraux ayant fait l’objet d’un examen par le groupe de travail

Caractéristique	EQ-5D	VR-12	SF-12	PROMIS-10 Global Health
Site Web	www.euroqol.org	www.bu.edu/sph/research/research-landing-page/vr-36-vr-12-and-vr-6d/	www.optum.com/solutions/life-sciences/answer-research/patient-insights/sf-health-surveys.html	www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis/intro-to-promis
Exigences en matière de licences et de coûts	Une licence est requise 8 W L O L V D W L R Q j G H V ¿ Q V commerciales : gratuite 8 W L O L V D W L R Q j G H V U ¿ Q V commerciales : les frais varient selon le projet Des frais peuvent s’appliquer pour l’examen des versions numériques	Aucune licence n’est requise, mais il faut obtenir une autorisation d’utilisation Utilisation gratuite	Une licence est requise Les frais varient selon le projet	Aucune licence n’est requise 8 W L O L V D W L R Q j G H V ¿ Q V commerciales : gratuite Utilisation à des ¿ Q V F R P P H U F L D O H V autorisation requise Il faut également obtenir une autorisation pour l’intégration de l’outil à une technologie exclusive Des frais peuvent s’appliquer pour les versions numériques

Tableau 5 Outils propres à une affection ayant fait l’objet d’un examen par le groupe de travail

Caractéristique	OHS et OKS		

Caractéristique	OHS et OKS (recommandation dans le cadre des lignes directrices internationales)	HOOS et KOOS	WOMAC
Site Web	innovation.ox.ac.uk/outcome-measures/oxford-hip-score-ohs/ https://innovation.ox.ac.uk/outcome-measures/oxford-knee-score-oks/	www.koos.nu/	www.womac.org/womac/index.htm
Renseignements relatifs aux licences et aux coûts	Une licence est requise 8WLOLVDWLRQ jGHV ¿QV QRQ commerciales : gratuite 8WLOLVDWLRQ jGHV ¿QV FRPPHUFLDOHV les frais varient selon le projet Des frais peuvent s’appliquer pour l’examen des versions numériques et du matériel de soutien	Aucune licence n’est requise Utilisation gratuite	Une licence est requise Les coûts varient selon le projet

Annexe2 : Outils de MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou utilisés sur la scène internationale



		Outils propres à une affection			Outils généraux			
Pays	Organisme	OHS et OKS	HOOS et KOOS (version complète et versions courtes PS, JR et à 12 éléments)	WOMAC	EQ-5D (versions 3L et 5L)	VR-12	PROMIS-10 Global Health	SF-12 (versions 1 et 2)
Pays-Bas	Registre d'arthroplastie des Pays-Bas (LROI)	X	X (version courte PS)	—	X (3L)	—	—	—
Nouvelle-Zélande	Registre d'arthroplastie de la Nouvelle-Zélande	X	—	—	—	—	—	—
Norvège	Registre d'arthroplastie de la Norvège	—	X (version complète)	—	X (5L)	—	—	—
Suède	Registre des arthroplasties de la hanche de la Suède	—	—	—	X (5L)	—	—	—
	Registre des arthroplasties du genou de la Suède	—	X (version complète)	—	X (3L)	—	—	—
Suisse	Registre d'arthroplastie de Genève	—	—	X	—	—	—	X (v.2)
Royaume-Uni	NHS, NJR	X	—	—	X (3L)	—	—	—
États-Unis	CMS, AJRR	—	X (version courte JR)	—	—	X	X	—
	FORCE-TJR	—	X (version courte à 12 éléments)	—	—	X	—	—
	Registre d'arthroplastie du Michigan	—	X (version courte JR)	—	—	—	X	—

5 H P D U T X H V

X : outil utilisé.

— Outil non utilisé.

L'information était exacte au moment de la rédaction; elle est fondée sur une analyse environnementale et pourrait ne pas être exhaustive.

Est-ce qu’un fichier minimal a été établi? Est-il possible d’obtenir de l’information par le couplage de données? Est-ce qu’un cadre juridique et une infrastructure de données ont été mis en place pour faciliter le couplage des données?

Par quel moyen les patients, les cliniciens et le personnel administratif peuvent-ils faire part de leurs commentaires sur le processus?

5 H V V R X U F H V H W L Q I U D V W U X F W X U H

Disposez-vous des ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un programme durable de MRDP (p. ex. coûts d’immobilisation et de fonctionnement, y compris le personnel de soutien ainsi que la mise au point et le déploiement d’une plateforme électronique)?

Quelles infrastructures de TI la collecte de MRDP et l’accès aux données exigent-ils (p. ex. à l’échelle des patients, des cliniciens, des analystes, des décideurs)?

Les systèmes sont-ils interopérables (p. ex. peuvent-ils être liés à des dossiers médicaux existants, à des portails de patients et à des données administratives ou de registres)?

Quelles pratiques ont été mises en place pour alléger le fardeau des patients et des administrateurs?

Respect de la vie privée et cadre juridique

Quels règlements et lois régissent la collecte, l’entreposage, le partage et la déclaration de données sur les patients, y compris les renseignements personnels sur la santé, au sein de votre région ou de votre pays? Des consultations ont-elles été menées auprès des spécialistes de la question du respect de la vie privée?

Quel type de consentement faut-il obtenir des patients et des fournisseurs de soins en vue de la collecte et du partage de données aux fins précisées dans le programme de MRDP, ou en vue d’une éventuelle demande de données de la part d’intervenants, à l’échelle nationale et internationale?

En matière de respect de la vie privée et de sécurité, quels protocoles ont été mis en place pour assurer le respect de ces politiques ou le traitement d’éventuelles demandes de données?

Outils de MRDP

Les outils choisis sont-ils offerts dans les langues dans lesquelles s’exprime la population cible? Les outils ont-ils été validés dans des contextes culturels appropriés?

Les outils choisis exigent-ils une licence d’utilisation? Les modalités d’utilisation sont-elles acceptables? Avez-vous pris en compte les frais connexes (p. ex. examen des versions électroniques, frais des utilisateurs finaux)?

Gestion et utilisation des données

Quels mécanismes de gestion et de gouvernance de données ont été établis?

Est-ce que des plans ont été mis en place pour l’utilisation des données recueillies?

Réalisation du sondage et collecte de données

Les considérations liées à la réalisation du sondage et à la collecte de données comprennent la sélection des outils de MRDP et les exigences connexes en matière de licences, la méthode d'échantillonnage, la méthode et les moments de collecte, ainsi que le fichier minimal (y compris les renseignements relatifs au sondage, à la dimension clinique et aux groupes clients).

Gouvernance et utilisation des données

Les considérations liées à la gouvernance et à l'utilisation des données comprennent la gestion des données; l'intégration aux dossiers médicaux électroniques, aux portails des patients ainsi qu'aux données administratives et de registres; l'accès aux données; de même que les mécanismes de déclaration et l'utilisation.

Respect de la vie privée et cadre juridique

Les considérations liées au respect de la vie privée et au cadre juridique comprennent les lois sur le respect de la vie privée régissant la collecte, l'entreposage, le partage et l'utilisation des données; le consentement du patient et du fournisseur de soins, ainsi que les principes de respect de la vie privée et le cadre juridique régissant le couplage des données.

Figure 2 : Objectifs et moments de collecte

Les objectifs de la collecte de données sur les MRDP peuvent influer sur les décisions concernant les moments de collecte. Le cheminement typique d'un patient susceptible de subir une arthroplastie commence par l'orientation vers le chirurgien, suivie par la consultation avec le chirurgien. Vient ensuite la décision de traiter le patient par chirurgie ou de recourir à un traitement non chirurgical. Si le patient et le chirurgien décident de recourir à la chirurgie, le patient peut être ajouté à la liste d'attente. Jusqu'à 8 semaines avant l'intervention, le patient répond à un sondage sur les MRDP. L'intervention a lieu, puis 12 mois après, le patient répond à un sondage sur les MRDP. La plage acceptable pour la collecte de données 12 mois après l'intervention va de 9 à 18 mois. La collecte de données avant et après l'intervention permet d'évaluer l'efficacité de l'intervention et la réadaptation pour les patients suivant un cheminement thérapeutique chirurgical et d'évaluer les résultats à long terme.

Toutefois, les patients peuvent recevoir de nombreux sondages dans tout le continuum de soins. Ces sondages permettent de suivre l'évolution de la maladie et d'évaluer la pertinence

Dunbar MJ, et al.; Appropriate questionnaires for knee arthroplasty: Results of a survey of 3600 patients from the Swedish Knee Arthroplasty Registry. The Journal of Bone and Joint Surgery. Vol. 83, nº 3, p. 339-344. 2001.

Fayers PM, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-Reported Outcomes. Wiley. Chichester. 2009.

Flynn KE, et al.; Using item banks to construct measures of patient reported outcomes in clinical trials: Investigator perceptions. Clinical Trials. Vol. 5, nº 6, p. 575-586. 2008.

Hanmer J, et al.; Cross-sectional validation of the PROMIS-Preference scoring system. PloS One. Vol. 13, nº 7, e0201093. 2018.

Inacio MCS, et al.; Increase in total joint arthroplasty projected from 2014 to 2046 in Australia: A conservative local model with international implications. Clinical Orthopaedics and Related Research. Vol. 475, nº 8, p. 2130-2137. 2017a.

Inacio MCS, et al.; Projected increase in total knee arthroplasty in the United States — An alternative projection model. Osteoarthritis and Cartilage. Vol. 25, nº 11, p. 1797-1803. 2017b.

Institut canadien d'information sur la santé. Manuel de collecte de données sur les mesures des résultats déclarés par les patients : arthroplasties de la hanche et du genou. 2018.

Institut canadien d'information sur la santé. Document d'information sur les PROM. Ottawa. 2015.

Institute for Healthcare Improvement. Triple Aim Initiative. 2018. Consulté le 15 novembre 2018.

International Consortium for Health Outcomes Measurement. Hip & Knee Osteoarthritis Reference Guide. Boston. 2015.

Janssen MF, Bonsel GJ, Luo N. Is EQ-5D-5L better than EQ-5D-3L? A head-to-head comparison

Organisation de coopération et de développement économiques. Panorama de la santé 2019. Paris. 2019a.

Organisation de coopération et de développement économiques. Recommendation of the Council on Health Data Governance

Terwee CB. The Value of Item Banks and PROMIS for Patient-Reported Outcome Measurement. Dutch-Flemish PROMIS. 2018.

Van Hout B, et al.; Interim scoring for the EQ-5D-5L: Mapping the EQ-5D-5L to EQ-5D-3L value sets. Value in Health. Vol. 15, p. 708-715. 2012.

Wagle NW. Implementing patient-reported outcome measurecm t7 0 EMCt5/a56p9.</L80908.