Bulletin | Modifié en avril 2018

Directives de codification de surdoses d’opioïdes

Le présent bulletin fournit des directives pour la codification et la saisie de données exactes et de qualité propres aux surdoses d’opioïdes seulement.

1. Diagnostic confirmé de s

2. Diagnostic possible (non confirmé) de surdose d'opioïdes

Directive pour la BDCP et le SNISA

Si le dossier indique un diagnostic de surdose d'opioïdes possible ou non confirmé (p. ex. diagnostic suspecté, discutable, écarté ou incertain de surdose d'opioïdes) et qu'un antidote aux opioïdes (p. ex. naloxone [Narcan]) n'est pas administré, la visite doit être classée comme une surdose possible d'opioïdes et le préfixe Q doit être attribué, à moins que d'autre documentation disponible confirme qu'il s'agit d'une surdose d'opioïde (voir la section 3, Utilisation de toute la documentation disponible).

Le tableau 2 ci-dessous comprend des exemples de l'application de cette directive.

Tableau 2 Exemples de diagnostics possibles (non confirmés) de surdose d'opioïdes; code attribué selon la banque de données et le niveau de soumission

	Code attribué selon la banque de données et le niveau de soumission		
Consignation au dossier	BDCP et SNISA — niveau 3*	SNISA — niveau 1 (modifié)†	SNISA — niveau 2, diagnostic de sortie du SU
Diagnostic possible de surdose d'opioïdes — le patient n'a pas reçu de Narcan	(Q) T40.28 (M) ou (MP)		

Bulletin

Tableau 3 Exemple d'utilisation de toute la documentation disponible, code attribué selon la banque de données et le niveau de soumission

Consignation au dossier	Code attribué selon la banque de données et le niveau de soumission		
	BDCP		

AnnexeB: Aide-mémoire sur les directives de codification des cas de surdose d’opioïdes

Le tableau ci-dessous résume les directives

Bulletin

Consignation au dossier	Administration d'antidote aux opioïdes