

CanDOT

Table des matières

Remerciements 4

Aperçu du projet 4

Élaboration du ¿ F K L H U P.L Q.L.P. D.O. 6

Contexte. 6

Remarques. 6

Historique des changements apportés aux éléments de données dans la version 1.8. . . . 7

Historique des changements apportés à l’ensemble de valeurs dans la version 1.8 7

Fichier minimal sur les dons de personnes décédées, version 1.8 8

Annexes. 46

Annexe A : Processus de don d’organes de personnes décédées 46

Annexe B : Codes des pays 47

Annexe C : HLA 54

Annexe D : Glossaire 55

$ Q Q H [H (7 H [W H G H U H P S O D.F. H.P.H.Q.W. S.R.X.U. Q.D. ¿ J.X.U.H 56

Bibliographie 57

Remerciements

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) souhaite remercier les membres du Forum consultatif d’experts cliniques sur les normes de données et du Forum consultatif d’experts opérationnels sur la gestion des données, réunis dans le cadre du projet de système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les dons d’organes et les transplantations, pour leur point de vue et leurs commentaires durant la rédaction du présent document.

L’ICIS adresse en outre ses remerciements à Richard Lam, Erik Markhauser, Ryan Metcalfe,

Ce projet, grâce aux collaborations avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, des organismes de santé, des cliniciens, des chercheurs, des patients et des intervenants du milieu des DOT, vise à soutenir l'amélioration de l'accès, des soins et des résultats liés aux DOT au Canada par le déploiement de solutions technologiques, l'intégration de systèmes et la déclaration pancanadienne de données et de mesures de la performance à l'échelle des systèmes. Le projet de système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les DOT de l'ICIS et Inforoute s'appuie, le cas échéant, sur les travaux de base déjà réalisés dans ce domaine, tels que les initiatives menées par les provinces et territoires et celles dirigées par la Société canadienne du sang et son comité consultatif d'experts sur les DOT.

Les objectifs établis par l'ICIS et Inforoute pour ce projet quinquennal sur les DOT sont les suivants :

- pODERUDWLRQ GH QRUPHV GH GRQQpHV HW GH ¿FKLHUV PLQL
  de personnes décédées, les dons de personnes vivantes et les transplantations (ICIS);
- acquisition de systèmes de gestion des données qui facilitent le déroulement du travail au point de service (Inforoute);
- conception, création et mise en œuvre d'un répertoire de données pancanadien (ICIS);
- pODERUDWLRQ HW GL‡XVLRQ GH PHVXUHV HW G¶LQGLFDWHXU
- mise en place de capacités et de services d'accès aux données pour orienter la prise de décisions, l'élaboration des politiques, la recherche et l'innovation (ICIS);
- mobilisation et gestion des intervenants (ICIS et Inforoute);
- JHVWLRQ GX SURMHW HW SODQL¿FDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH

Pour en savoir plus sur le projet, visitez la page Projet de système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les dons d'organes et transplantations (DOT) du site Web de l'ICIS au icis.ca/dot ou la page Gestion des données sur les dons et transplantations d'organes du site Web d'Inforoute.

Élaboration du fichier minimal

Contexte

&H GRFXPHQW SUpVHQWH OH ¿FKLHU PLQLPDO VXU OHV GRQV G
qui est l’un des produits livrables dans le cadre du projet de système pancanadien de données
HW GH PHVXUH GH OD SHUIRUPDQFH SRXU OHV '27 ¿QDQFp SDU
O¶,&,6 HW ,QIRURXWH 6DQWp GX &DQDGD '¶DXWUHV ¿FKLHUV P
dons de personnes vivantes et les transplantations, lesquels sont disponibles sur la page
Projet de système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les DOT
du site Web de l’ICIS.

/H ¿FKLHU PLQLPDO VXU OHV '3' YLVH j DPpOLRUHU OHV UpVXO
de mesures et d’indicateurs de performance connexes, à l’échelle des systèmes. Il sera utilisé
SDU,QIRURXWH GDQV OH FDGUH GX SURMHW D¿Q G¶RULHQWHU O
touchant au don d’organes (p. ex. le système de gestion des DPD) et les investissements qui
V¶\ UDSSRUWHQW /¶pODERUDWLRQ GH FH ¿FKLHU PLQLPDO D p
de divers intervenants, comme les membres du Forum consultatif d’experts cliniques sur les
normes de données et du Forum consultatif d’experts opérationnels sur la gestion des données

- eWDQW GRQQp TXH OH SURFHVVXV G¶XQ SURJUDPPH GH GRQV GX SURFHVVXV JpQpUL TXH GHV pWDSHV GX SURFHVVXV GH GRQ GH [illegible]

Fichier minimal sur les dons de personnes décédées, version 1.8

Étape 1 Orientation

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.1	Numéro d'assurance maladie du donneur	Le numéro d'assurance maladie (NAM) provincial ou territorial du donneur (requis pour le couplage de données)	Numéro conforme à la convention provinciale ou territoriale sur l'attribution du NAM
1.2	Autorité émettrice du numéro d'assurance maladie du donneur	La province ou le territoire qui a émis le NAM du donneur	• AB : Alberta • BC : Colombie-Britannique • MB : Manitoba • NB : Nouveau-Brunswick • NL : Terre-Neuve-et-Labrador • NS : Nouvelle-Écosse • NT : Territoires du Nord-Ouest • NU : Nunavut • ON : Ontario • PE : Île-du-Prince-Édouard • QC : Québec • SK : Saskatchewan • YT : Yukon • CA : Canada (détenus, Services aux Autochtones Canada, Anciens Combattants Canada) Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs sont tirés du modèle de données de référence de l'ICIS (MDRI).
1.3			

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.11	Groupe racialisé	L'origine raciale du donneur (telle que	

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.12	Identité autochtone	L'identité autochtone du donneur (membre des Premières Nations, Métis ou Inuk/Inuit), tel que le donneur l'exprime	• 29921000087109 : Premières Nations • 29931000087106 : Inuk/Inuit • 29941000087100 : Métis • 1 1RQ OD SHUVRQQH QH V¶LGHQWLILH SDV FRPP des Premières Nations, Métis ou Inuk/Inuit) • ASKD : Préfère ne pas répondre (la personne a refusé de répondre) • ASKU : Ne sait pas (la personne ne connaît pas son identité autochtone) • NASK : La question n'a pas été m

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.14	Issue du don pour les donneurs inscrits	L'issue privilégiée par le donneur pour son don d'organes, telle que consignée au registre de don d'organes et de tissus de sa province ou de son territoire	• 37401000087100 : Don d'organe pour une transplantation • 37391000087103 : Don d'organe pour la recherche • NA : Sans objet • UNK : Inconnu Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes NA et UNK proviennent de la norme HL7.
1.15	Organes visés par le consentement du donneur d'après le registre	Les organes que la personne a consenti à donner d'après le registre (organes inclus dans le registre)	• BOW : Intestins • HRT : Cœur • KDD : Reins/dialyse (inclut les transplantations en bloc) • LUB : Poumon — transplantation bilatérale/en bloc • LVR : Foie — entier • PAN : Pancréas — entier Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent du MDRI.
1.16	Établissement à l'origine du signalement ou de l'orientation	L'établissement à la source du signalement ou de l'orientation du donneur vers l'organisme de don d'organes en vue d'un don d'organes. Si le ou les organes ont été reçus d'un autre organisme de don d'organes du Canada, indiquer l'organisme qui a transmisT* (l'orientation du donneur vers l'organisme de g (icgnalement ou)Tj EMC /P <</Lang (fr-CA)/MCID 618 >>BDC 185s d icg <</Lang (f	

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.5	Personne ayant entamé OD GLVFXVVLRQ RˆFLDOH de consentement	, GHQWLˆH OD SHUVRQQH ayant entamé la discussion officielle de consentement	• 37461000087101 : Coordonnateur du don d'organes/spécialiste • 37471000087105 : Médecin spécialiste du don d'organes • 133932002 : Autre fournisseur de soins • 34981000087109 : Mandataire spécial • UNK : Inconnu Remarques Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; le code UNK provient de la norme HL7. Les valeurs sont dérivées de celles du projet sur les occasions de dons manquées de la Collaboration.
2.5.1	Participation d'un spécialiste du don d'organes	Indique si un spécialiste du don G¶RUJDQHV DˆOLp j XQ RUJDQLVPH GH don d'organes (p. ex. un médecin) D SDUWLFLSp j OD GLVFXVVLRQ RˆFLHOOH de consentement	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
2.6	'DWH GH OD GLVFXVVLRQ de consentement	La date à laquelle le mandataire spécial du donneur a été abordé pour une GLVFXVVLRQ RˆFLHOOH GH FRQVHQWHPHQW	AAAAMMJJ
2.6.1	+HXUH GH OD GLVFXVVLRQ de consentement	L'heure à laquelle le mandataire spécial du donneur a été abordé pour une GLVFXVVLRQ RˆFLHOOH GH FRQVHQWHPHQW	HHMM Remarque : Système horaire de 24 heures

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
2.7	Motif de l’absence de discussion R ˆ F L H O O H G H F R Q V H Q W H P H Q W	La raison pour laquelle le mandataire spécial du donneur n’a pas été abordé pour une discussion R ˆ F L H Q G H O D F R Q V H Q W H P H Q W	• 1 : Le passage imminent du patient aux soins de confort • 2 : Le mandataire spécial n’a pas accepté le pronostic • 3 : Le mandataire spécial a refusé la démarche d’approche • 4 : Le mandataire spécial est demeuré introuvable • 5 : Le médecin responsable du cas n’a pas donné son aval • 6 : Le médecin légiste ou le coroner a signalé son refus • 7 : Le programme de transplantation n’a démontré aucun intérêt • 702371008 : La démarche était impossible en raison de l’état de santé du patient • OTH : Autre • UNK : Inconnu Remarques Le code 702371008 de l’ensemble de valeurs provient de l’édition canadienne de la SNOMED CT; les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7. Les valeurs sont dérivées de celles du projet sur les occasions de dons manquées de la Collaboration.
2.8	Consentement au don d’organes	Indique si le mandataire spécial du donneur a accordé son consentement pour le don de chaque organe	• Y : Oui • N : Non Remarque : Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.10	Organes visés par un consentement	Les organes pour lesquels un consentement au don a été obtenu légalement	• BOW : Intestins • HRT : Cœur • KDD : Reins/dialyse (inclut les transplantations en bloc) • LUB : Poumon — transplantation bilatérale/en bloc • LVR : Foie — entier • PAN : Pancréas — entier Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent du MDRI.
2.11	Date du consentement	La date à laquelle le consentement du mandataire spécial a été obtenu pour l'organe ou les organes mentionné(s)	AAAAMMJJ Remarque : /RUVTXH OH FRQVHQWHPHQW D pWp GRQQp RUJDQHV j GL‡pUHQWV PRPHQWV LQVFULUH OD GDW consentement obtenu.
2.11.1	Heure du consentement	L'heure à laquelle le consentement du mandataire spécial a été obtenu pour l'organe ou les organes mentionné(s)	HHMM Remarque : Système horaire de 24 heures /RUVTXH OH FRQVHQWHPHQW D pWp GRQQp SRXU GL GL‡pUHQWV PRPHQWV LQVFULUH O¶KHXUH GX SUHP
2.12	Issue du don d'organes consenti	L'issue privilégiée par le mandataire spécial du donneur pour le don d'organes consenti	• 37401000087100 : Don d'organe pour une transplantation • 37391000087103 : Don d'organe pour la recherche • 37381000087100 : Don d'organe pour l'enseignement de la médecine Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.13	Retrait du consentement	Indique si le mandataire spécial a retiré son consentement au don	• Y : Oui • N : Non Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.14	Motif du retrait du consentement	La raison avancée par le mandataire spécial pour retirer son consentement	• 1 : Le mandataire spécial n'a pas voulu que le patient soit transféré • 2 : Le mandataire spécial a estimé que la procédure de don d'organes était trop longue • OTH : Autre • UNK : Inconnu Remarque : Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7.
2.15	Organes visés par le retrait du consentement	La liste des organes pour lesquels le consentement précédemment obtenu a été retiré	• BOW : IntestineTj ET EMC BmQ201/Lang (fr-CA)/MCID 1189 >>BDC BT -03C Tw 1

Étape 3 Gestion du donneur

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
3.1	Donneur répondant à des critères élargis	Indique si le donneur est associé à un risque accru d’échec de la transplantation, en raison de ses problèmes de santé et de sa complexité médicale	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l’élément de données provient de l’édition canadienne de la SNOMED CT (Donneur répondant à des critères pODUJLV SRXU XQH JUH‡H G RUJDQH /de l’ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.2	Donneur de la liste de distribution exceptionnelle	Les antécédents médicaux ou le comportement social du donneur indiquent un risque accru de transmission d’une maladie au receveur	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l’élément de données provient de l’édition canadienne de la SNOMED CT (Donneur de la liste de distribution exceptionnelle : 34421000087104). Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.3	Donneur à risque accru	Les antécédents médicaux ou le comportement social du donneur indiquent un risque accru de transmission de l’hépatite B, de l’hépatite C ou du virus de O¶LPPXQRGp¿FLHQFH KXPDLQH 9,+au receveur	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l’élément de données provient de l’édition canadienne de la SNOMED CT (Donneur à risque accru : 34461000087109). Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.

Système canadien de données sur les dons d’organes et les transplantations (CanDOT) :
fichier minimal sur les dons de personnes décédées, version 1.8

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.22	Virus du Nil occidental	Indique si le donneur était atteint du virus du Nil occidental — F R Q ¿ U P p 9 D H U V W Q G H G p W H F W L R Q des immunoglobulines G (IgG) ou des immunoglobulines M (IgM) R X X Q W H V W G ¶ D P S O L ¿ F D W L R Q G ¶ D F L G H V nucléiques (TAAN) — au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7 H V W Q R Q H ‡ H F W X p • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Anticorps du virus du Nil occidental : 421862008). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; le code UNK provient de la norme HL7.
3.23	Rage	Indique si le donneur avait la rage au moment de la transplantation	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Rage : 14168008). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.24	Maladie de Creutzfeldt-Jakob	Indique si l'on avait diagnostiqué la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ, aussi appelée maladie de la vache folle) chez le donneur au moment de la transplantation	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Maladie de Creutzfeldt-Jakob : 792004). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.25	Prématurité	Indique si le donneur est considéré comme prématuré (âge gestationnel inférieur à 36 semaines)	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu • NA : Sans objet Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (Enfant prématuré : 76517-2). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.26	Antécédents d'hyperlipidémie	Indique si le taux des lipides dans le plasma du donneur était élevé (cholestérol, triglycérides et lipoprotéines)	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Antécédents d'hyperlipidémie : 37591000087105). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.27	Taux de créatinine sérique au décès	Le taux de créatinine du donneur au moment du décès (en mg/dl)	• De 0,00 à XX,XX mg/dl Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (Créatinine [Concentration de masse] : 2160-0). En outre, le système UCUM dicte l'unité de mesure à employer.
3.30	Interprétation de l'artériographie coronaire	Indique si le donneur a subi une artériographie coronaire et, si tel est le cas, si le fonctionnement était normal ou pas lors du dernier test	• 280413001 : Résultat normal • 280415008 : Résultat anormal • 7 H V W Q R Q H ‡ H F W X p • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Interprétation de l'artériographie coronaire : 37321000087101). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.31	Interprétation de la radiographie	Indique si le donneur a subi une radiographie et, si tel est le cas, si le résultat était normal ou pas lors du dernier test	• 280413001 : Résultat normal • 280415008 : Résultat anormal • 7 H V W Q R Q H ‡ H F W X p •

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.32	'pELW GH ¿OWUDWLRQ GH GpELW GH ¿OWUDWLRQ glomérulaire estimé	(DFGe) du donneur	• De 0,00 à 120 Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition FDQDGLHQQH GH 6DQWp (' &7 'pELW GH ¿OWUDWLRQ JORPpUXODLUH HVWLPp estimé : 37571000087106).
3.33	Score du Kidney Donor Risk Index du donneur de rein	L'indice Kidney Donor Risk Index (KDRI) du donneur de rein au moment de la transplantation	• De 0,00 à 9,99 Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Score du Kidney Donor Risk Index du donneur de rein : 37341000087105).
3.36	Détection de l'antigène de surface de l'hépatite B	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'antigène de surface de l'hépatite B (Ag HBs) au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Détection de l'antigène de surface de l'hépatite B : 47758006). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.37	Détection de l'anticorps anti-HBc	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'anticorps anti-HBc au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Détection de l'anticorps anti-HBc : 59582004). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.38	Détection de l'anticorps de l'hépatite C	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'anticorps de l'hépatite C au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Détection de l'anticorps de l'hépatite C : 64411004). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.39	Sérologie du virus d'Epstein-Barr	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'anticorps du virus d'Epstein-Barr au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Sérologie du virus d'Epstein-Barr : 408219003). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.40	Test de détection de l'antigène du virus de O¶LPPXQRGp¿FLHQFH	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'antigène du virus de O¶LPPXQRGp¿FLHQFH au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Test de détection de l'antigène GX YLUXV GH O¶LPPXQRGp¿FLHQFH) Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.41	Détection de l'anticorps du cytomégalovirus	Indique si le résultat était positif lorsque le donneur a été testé pour l'anticorps du cytomégalovirus (CMV) au moment de la transplantation	• 10828004 : Positif • 260385009 : Négatif • 7HVW QRQ H‡HFWXp • 373068000 : Indéterminé Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Détection de l'anticorps du cytomégalovirus : 30200007). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.49	3 U R ¿ O + / $ &	Les deux types d'antigène HLA C du donneur	Voir l'annexe C S R X U O D O L V W H G H V V S p F L ¿ F L W p V V p U R O F de l'antigène leucocytaire humain Autres valeurs : • 37501000087101 : Typage de l'antigène leucocytaire humain — S D V G D Q W L J q Q H L G H Q W L ¿ p • 8 1 . , Q F R Q Q X Q R Q G L V S R Q L E O H W \ S D J H Q R Q H ‡ H I • OTH : Autre Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (HLA-C [Type] : 13302-5). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.
3.50	3 U R ¿ O + / $ ' 5	Les deux types d'antigène HLA DR du donneur	Voir l'annexe C S R X U O D O L V W H G H V V S p F L ¿ F L W p V V p U R O F de l'antigène leucocytaire humain Autres valeurs : • 37501000087101 : Typage de l'antigène leucocytaire humain — S D V G D Q W L J q Q H L G H Q W L ¿ p • 8 1 . , Q F R Q Q X Q R Q G L V S R Q L E O H W \ S D J H Q R Q H ‡ H I • OTH : Autre Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (HLA-DR locus [Type] : 21341-3). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.51	3 U R ¿ O + / $ ' 4	Les deux types d'antigène HLA DQ du donneur	Voir l'annexe C S R X U O D O L V W H G H V V S p F L ¿ F L W p V V p U R O F de l'antigène leucocytaire humain Autres valeurs : • 37501000087101 : Typage de l'antigène leucocytaire humain — S D V G D Q W L J q Q H L G H Q W L ¿ p • 8 1 . , Q F R Q Q X Q R Q G L V S R Q L E O H W \ S D J H Q R Q H ‡ H I • OTH : Autre Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (HLA-DQ locus 2 [Type] : 34143-8). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.
3.51.1	3 U R ¿ O + / $ ' 3	Les deux types d'antigène HLA DP du donneur	Voir l'annexe C S R X U O D O L V W H G H V V S p F L ¿ F L W p V V p U R O F de l'antigène leucocytaire humain Autres valeurs : • 37501000087101 : Typage de l'antigène leucocytaire humain — S D V G D Q W L J q Q H L G H Q W L ¿ p • 8 1 . , Q F R Q Q X Q R Q G L V S R Q L E O H W \ S D J H Q R Q H ‡ H I • OTH : Autre Remarque : Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (HLA-DP [Type] : 12285-3). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.
3.52	e W D W G H O ¶ R ‡ U H	/ ¶ p W D W G H F K D T X H R ‡ U H • 385645004 : Accord de don d'organes pour l'organe visé par un consentement, au moment de la soumission des données	• 443390004 : Refus • 247755007 : Retrait • 89925002 : Annulation Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
3.53	' D W H G H O ¶ R ‡ U H	3 R X U F K D T X H R ‡ U H O D G A D A M J J O D T X H O O H l'organe visé par un consentement a été R ‡ H U W S D U O ¶ R U J D Q L V P H G H G R Q G ¶ R U J D Q H V	

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.56	Raison du refus	/ D U D L V R Q S R X U O D T X H O O H G H F ‡ G H D ‡ H U W a été refusé ou jugé incompatible	• 1 : Décès circulatoire • 2 : Aucun receveur compatible (ABO/taille/problèmes d'histocompatibilité) • 3 : Organe jugé non approprié (dommage anatomique, imperfection, traumatisme, etc.) • 4 : Tumeur maligne avérée ou suspectée • 5 : Ischémie chaude ou froide prolongée • 6 : Résultat positif à un test sérologique ou virologique • 7 : Comportement à risque • 8 : Problèmes logistiques • 9 : Problèmes liés au receveur (problèmes d'ordre médical, non-disponibilité, refus) • 10 : Résultat de test anormal • 5 p V X O W D W G H W H V W Q R Q G L V S R Q L E O H R X W H V • 12 : État de santé du donneur trop instable pour la transplantation • 11761000087106 : Âge du patient • 417662000 : Antécédents de constatation clinique • 165325009 : Résultat de biopsie anormal • 365981007 : Tabagisme • 40733004 : Infection • OTH : Autre • UNK : Inconnu Remarques Les codes 11761000087106, 417662000, 165325009, 365981007 et 40733004 de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7. Les valeurs sont dérivées de celles du projet sur les occasions de dons manquées de la Collaboration.

Système canadien de données sur les dons d’organes et les transplantations (CanDOT) :
fichier minimal sur les dons de personnes décédées, version 1.8

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.63	Autorité émettrice du numéro d'assurance maladie du receveur	La province ou le territoire qui a émis le NAM du receveur	•

Étape 4 Prélèvement des organes

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
4.2	Traitement essentiel au maintien de la vie arrêté	Indique si le traitement essentiel au maintien de la vie a été interrompu, que des organes aient été prélevés sur le donneur ou non	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (Traitement essentiel au maintien de la vie arrêté : 35031000087105). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
4.3	Date de l'arrêt du traitement essentiel au maintien de la vie	La date à laquelle le traitement essentiel au maintien de la vie a été interrompu	AAAAMMJJ
4.3.1	Heure de l'arrêt du traitement essentiel au maintien de la vie	L'heure à laquelle le traitement essentiel	

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
4.11	Organe prélevé	L’organe que l’on compte prélever, peu importe si le prélèvement D H ‡ H F W L Y H P H Q W O L H X	• BOW : Intestins • HRT : Cœur • HLC : Combinaison cœur-poumon • KDT : Rein — transplantation bilatérale/en bloc • KDL : Rein — gauche • KDR : Rein — droit • LUB : Poumon — transplantation bilatérale/en bloc • LUL : Poumon — gauche • LUR : Poumon — droit • LVR : Foie — entier • LLL : Foie — lobe gauche • LRL : Foie — lobe droit • LLS : Foie — segment latéral • LMS

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
4.12	Date du clampage	La date à laquelle le clampage aortique D p W p H ‡ H F W X p	AAAAMMJJ
4.12.1	Heure du clampage	L'heure à laquelle le clampage aortique D p W p H ‡ H F W X p	HHMM Remarque : Système horaire de 24 heures
4.13	État du dispositif de perfusion	Indique si un dispositif de perfusion a été utilisé pour l'organe ou les organes mentionné(s)	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
4.14	Dispositif de perfusion utilisé	Le dispositif utilisé pour la perfusion de l'organe ou des organes mentionné(s)	• 37451000087104 : Pompe à perfusion rénale • 37441000087102 : Pompe ex vivo • UNK : Inconnu Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; le code UNK provient de la norme HL7.
4.16	Durée d'ischémie chaude fonctionnelle	Le temps écoulé (en minutes) entre l'hypotension/hypoxie du donneur et le début du processus de préservation à froid	De 0 à 1 440 minutes (de 0 à 24 heures) Remarque : Le système UCUM dicte l'unité de mesure à employer.
4.17	Date de début de la préservation à froid	La date à laquelle a débuté la préservation à froid de l'organe ou des organes mentionné(s)	AAAAMMJJ
4.17.1	Heure de début de la préservation à froid	L'heure à laquelle a débuté la préservation à froid de l'organe ou des organes mentionné(s)	HHMM Remarque : Système horaire de 24 heures

Système canadien de données sur les dons d’organes et les transplantations (CanDOT) :
fichier minimal sur les dons de personnes décédées, version 1.8

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
5.3	Raison de la non-transplantation	La raison pour laquelle l'organe mentionné n'a pas été transplanté sur un receveur	• 1 : Organe jugé non approprié pour la transplantation • 2 : Problèmes liés au receveur • 3 : Complication chirurgicale (problème de sécurité) • 4 : Complication logistique (liée au personnel ou au transport) • OTH : Autre • UNK : Inconnu Remarque : Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7. Les valeurs sont dérivées de celles du projet sur les occasions de don manquées de la Collaboration.
5.9	Issue de l'organe	L'issue de l'organe prélevé mais non transplanté	• 37391000087103 : Don d'organe pour la recherche • 37381000087100 : Don d'organe pour l'enseignement de la médecine • 37611000087100 : Transfert de l'organe à un service de pathologie • 262009000 : Non utilisé • UNK : Inconnu Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; le code UNK provient de la norme HL7.

Annexes

Annexe A : Processus de don d’organes de personnes décédées

Annexe B : Codes des pays

Le tableau ci-dessous fournit une liste des codes de pays pour l’élément de données 1.10 (Pays du donneur). Cette liste de sélection des codes de pays normalisés élaborée par l’ICIS est un sous-ensemble de la norme ISO 3166-1 actuelle. Elle comprend 249 codes de pays uniques pertinents pour le Canada, y compris 2 autres codes de pays de Statistique Canada — Kosovo (XKO) et Sercq (XSQ) — qui ne font pas partie de la norme ISO 3166-1. Elle comprend également 2 codes — OTH (autre) et UNK (inconnu) — qui ne font pas partie de la norme ISO, mais de celle de l’ICIS. Pour certains pays, le nom abrégé utilisé est celui de Statistique Canada plutôt que celui provenant de la norme ISO 3166-1.

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
AFG	Afghanistan	Afghanistan
ALA	Åland Islands	Åland, Îles
ALB	Albania	Albanie
DZA	Algeria	Algérie
ASM	American Samoa	Samoa américaine
AND	Andorra	Andorre
AGO	Angola	Angola
AIA	Anguilla	Anguilla
ATA	Antarctica	Antarctique
ATG	Antigua and Barbuda	Antigua-et-Barbuda
ARG	Argentina	Argentine
ARM	Armenia	Arménie
ABW	Aruba	Aruba
AUS	Australia	Australie
AUT	Austria	Autriche
AZE	Azerbaijan	Azerbaïdjan
BHS	Bahamas	Bahamas
BHR	Bahrain	Bahreïn
BGD	Bangladesh	Bangladesh
BRB	Barbados	Barbade
BLR	Belarus	Bélarus
BEL	Belgium	Belgique
BLZ	Belize	Belize
BEN	Benin	Bénin
BMU	Bermuda	Bermudes
BTN	Bhutan	Bhoutan

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
DOM	Dominican Republic	Dominicaine, République
ECU	Ecuador	Équateur
EGY	Egypt	Égypte
SLV	El Salvador	El Salvador
GNQ	Equatorial Guinea	Guinée équatoriale
ERI	Eritrea	Érythrée
EST	Estonia	Estonie
ETH	Ethiopia	Éthiopie
FLK	Falkland Islands (Malvinas)	Falkland, Îles (Malvinas)
FRO	Faroe Islands	Féroé, Îles
FJI	Fiji	Fidji
FIN	Finland	Finlande
FRA	France	France
GUF	French Guiana	Guyane française
PYF	French Polynesia	Polynésie française
ATF	French Southern Territories	Terres australes françaises
GAB	Gabon	Gabon
GMB	40Nbie	
GEO	Georgia	Géorgie
DEU	Germany	Allemagne
GHA	Ghana	Ghana
GIB	4ibraltar	
GRC	Greece	Grèce
GRL	Greenland	Groenland
GRD	Grenada	Grenade
GLP	Guadeloupe	
GUM	Guam	Guam
GTM	4uatemala	
GGY	Guernsey	Guernesey
GIN	Guinea	Guinée
GNB	Guinea-Bissau	Guinée-Bissau
GUY	Guyana	4uyana
HTI	42.985dpe	

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
MHL	Marshall Islands	Marshall, Îles
MTQ	Martinique	Martinique
MRT	Mauritania	Mauritanie
MUS	Mauritius	Maurice
MYT	Mayotte	Mayotte
MEX	Mexico	Mexique
FSM	Micronesia, Federated States of	Micronésie, États fédérés de
MDA	Moldova	Moldova
MCO	Monaco	Monaco
MNG	Mongolia	Mongolie
MNE	Montenegro	Monténégro
MSR	Montserrat	Montserrat
MAR	Morocco	Maroc
MOZ	Mozambique	Mozambique
NAM	Namibia	Namibie
NRU	Nauru	Nauru
NPL	Nepal	Népal
NLD	Netherlands	Pays-Bas
NCL	New Caledonia	Nouvelle-Calédonie
NZL	New Zealand	Nouvelle-Zélande
NIC	Nicaragua	Nicaragua
NER	Niger	Niger
NGA	Nigeria	Nigéria
NIU	Niue	Niue
NFK	Norfolk Island	Norfolk, Île
MNP	Northern Mariana Islands	Mariannes du Nord, Îles
NOR	Norway	Norvège
OMN	Oman	Oman
PAK	Pakistan	Pakistan
PLW	Palau	Palaos
PAN	Panama	Panama
PNG	Papua New Guinea	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PRY	Paraguay	Paraguay
PER	Peru	Pérou
PHL	Philippines	Philippines
PCN	Pitcairn	Pitcairn
POL	Poland	Pologne
PRT	Portugal	Portugal

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
PRI	Puerto Rico	Porto Rico
QAT	Qatar	Qatar
REU	Réunion	Réunion
ROU	Romania	Roumanie
RUS	Russian Federation	Russie, Fédération de
RWA	Rwanda	Rwanda
BLM	Saint Barthélemy	Saint-Barthélemy
SHN	Saint Helena	Sainte-Hélène
KNA	Saint Kitts and Nevis	Saint-Kitts-et-Nevis
LCA	Saint Lucia	Sainte-Lucie
MAF	Saint Martin (French part)	Saint-Martin (partie française)
SPM	Saint Pierre and Miquelon	Saint-Pierre-et-Miquelon
VCT	Saint Vincent and the Grenadines	Saint-Vincent-et-les Grenadines
WSM	Samoa	Samoa
SMR	San Marino	Saint-Marin
STP	Sao Tome and Principe	Sao Tomé-et-Principe
XSQ	Sark	Sercq
SAU	Saudi Arabia	Arabie saoudite
SEN	Senegal	Sénégal
SRB	Serbia	Serbie
SYC	Seychelles	Seychelles
SLE	Sierra Leone	Sierra Leone
SGP	Singapore	Singapour
SXM	Sint Maarten (Dutch part)	Saint-Martin (partie néerlandaise)
SVK	Slovakia	Slovaquie
SVN	Slovenia	Slovénie
SLB	Solomon Islands	Salomon, Îles
SOM	Somalia	Somalie
ZAF	South Africa, Republic of	Afrique du Sud, République d’
SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands	Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
SSD	South Sudan	Soudan du Sud
ESP	Spain	Espagne
LKA	Sri Lanka	Sri Lanka
SDN	Sudan	Soudan
SUR	Suriname	Suriname
SJM	Svalbard and Jan Mayen	Svalbard et l’Île Jan Mayen
SWZ	Swaziland	Swaziland

Annexe C : Valeurs HLA

Le tableau ci-dessous fournit une liste des valeurs HLA pour les éléments de données
j 3 U R $ O % + / $ & ' 4 ' 5 H W ' 3 U H V S H F W L Y H P H Q W & H V Y D
proviennent de la base de données IPD-IMGT/HLA (Immuno Polymorphism Database–ImMunoGeneTics/Human Leukocyte Antigen).

Groupe	Valeurs valides
HLA A	A1, A2, A203, A210, A3, A9, A10, A11, A19, A23(9), A24(9), A2403, A25(10), A26(10), A28, A29(19), A30(19), A31(19), A32(19), A33(19), A34(10), A36, A43, A66(10), A68(28), A69(28), A74(19), A80
HLA B	B5, B7, B703, B8, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B21, B22, B27, B2708, B35, B37, B38(16), B39(16), B3901, B3902, B40, B4005, B41, B42, B44(12), B45(12), B46, B47, B48, B49(21), B50(21), B51(5), B5102, B5103, B52(5), B53, B54(22), B55(22), B56(22), B57(17), B58(17), B59, B60(40), B61(40), B62(15), B63(15), B64(14), B65(14), B67, B70, B71(70), B72(70), B73, B75(15), B76(15), B77(15), B78, B81, B82, Bw4, Bw6
HLA C	Cw1, CBw6

Annexe E : Texte de remplacement pour la figure

Figure Processus de don d’organes de personnes décédées

&HWWH ¿JXUH PRQWUH OD SURFpGXUH JOREDOH VXLYLH GDQV un parcours optimal, mais présente aussi des situations où le don ne se conclut pas, soit parce que le patient est jugé inadmissible ou que les organes visés par le consentement sont jugés inappropriés au cours du processus.

/H SDUFRXUV FRPPHQFH DX PRPHQW R• XQ K{SLWDO LGHQWLL¿H une orientation vers un organisme de don d’organes (ODO). L’ODO reçoit la demande et, dès ce moment, il coordonne et gère le cas.

L’ODO évalue le cas et communique avec le plus proche parent du patient ou le mandataire spécial pour obtenir un consentement au don.

Une fois le consentement obtenu, une évaluation permet de recueillir et d’analyser les renseignements médicaux ou cliniques sur le donneur ou les organes visés par le consentement.

3DU OD VXLWH OHV RUJDQHV YLVpV SDU OH FRQVHQWHPHQW V receveur compatible.

8QH IRLV OHV RUJDQHV DWWULEXpV OD ORJLVWLTXH HVW SOD et la transplantation, et les chirurgies connexes ont lieu.

8Q SODQ HVW PLV HQ °XYUH SRXU DLGHU OHV SDWLHQWV RX O les chirurgies.

Remarques

'DQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV O¶K{SLWDO TXL HVW j O¶RULJL OH SUpOqYHPHQW SHXW rWUH OH PrPH TXH O¶K{SLWDO TXL H‡H O¶K{SLWDO j O¶RULJLQH GH O¶RULHQWDWLRQ SHXW DXVVL rWU

L’évaluation de la transplantation (étape 4) met habituellement à contribution l’hôpital R• VHUD H‡HFWXpH OD WUDQVSODQWDWLRQ DLQVL TXH O¶RUJD qui est à l’origine de l’orientation.

Organ Procurement and Exchange of Newfoundland and Labrador. Communications personnelles. 2020-2021.

Organize. Figure 4: How an organ is managed (or not) in our current organ donation system. In : The Costly Effects of an Outdated Organ Donation System: Summary of Findings. 2020.

Programme de prélèvement d’organes et de tissus du Nouveau-Brunswick. Communications personnelles. 2020-2021.

Rao PS, et al.

Société canadienne du sang. Kidney Data Working Group Report. 2015.

Société canadienne du sang. Liver Data Working Group Report. 2015.

Société canadienne du sang. Lung Data Working Group Report. 2015.

Société canadienne du sang. National Death Audit Strategy — Progress Summary Report. 2018.

Société canadienne du sang. Pancreas Data Working Group Report. 2016.

Southern Alberta Organ and Tissue Donation Program. Communications personnelles. 2020-2021.

Transplant Manitoba Gift of Life. Communications personnelles. 2020-2021.

Transplant Québec. Site Web de Transplant Québec. Consulté en février 2021.

U.S. Department of Health and Human Services, Organ Procurement and Transplantation Network. Organ Procurement and Transplantation Network. Consulté en février 2021.

= D Y D O N R ‡ 6 H W D O Potential organ donor identification and system accountability: Expert guidance from a Canadian consensus conference. Journal canadien d’anesthésie. Avril 2019.