Le fchier minimal sur les DPV vise à améliorer les résultats des DOT en appuyant la difusion de mesures et d’indicateurs de performance connexes, à l’échelle du système. Il sera utilisé par Inforoute dans le cadre du projet, afn d’orienter le perfectionnement des diverses technologies touchant au don d’organes (p. ex. les systèmes de gestion des transplantations et de DPV) et les investissements qui s’y rapportent. L’élaboration de ce fchier minimal a été rendue possible grâce à l’engagement de divers intervenants, comme les membres du Forum consultatif d’experts cliniques sur les normes de données et du Forum consultatif d’experts opérationnels sur la gestion des données ainsi que les membres d’autres groupes de travail propres au projet, les participants au groupe de travail sur les systèmes de données de la Collaboration et bien d’autres encore. Une liste des membres se trouve à la page sur les groupes consultatifs externes du projet sur les DOT du site Web de l’ICIS.

Remarques

- **Parcours du donneur :** Le fchier minimal sur les DPV est organisé en fonction des étapes qui se trouvent le long du processus de don d’organes de personnes vivantes (voir l’annexe A). Les principales étapes de ce processus sont les suivantes :
  1. Orientation du donneur vivant
  2. Gestion du don de donneur vivant
  3. Chirurgie de don d’organe
  4. Suivi du donneur vivant
- Étant donné que le processus d’un programme de dons d’organes et de tissus peut diférer du processus générique décrit à l’annexe A, les éléments du fchier minimal peuvent être saisis dans un ordre diférent de celui présenté.
- **Données sur l’organe :** L’ICIS entend recueillir les données sur chaque organe à chacune des étapes du parcours du donneur.

Étape	Nom de l'élément de données	Modification
Étape 2 : Gestion du don de donneur vivant	• Test de détection de l'antigène du virus de l'immunodéficience humaine • Détection de l'anticorps du virus du lymphome humain à cellules T de type 1 et de type 2	Supprimé
	• Donneur de la liste de distribution exceptionnelle • Profil HLA A • Profil HLA B • Profil HLA C • Profil HLA DR • Profil HLA DQ • Profil HLA DP • Date de la décision de ne pas effectuer la chirurgie de prélèvement	Ajouté
Étape 3 : Chirurgie de don d'organe	• Date du début du prélèvement d'organes • Heure du début du prélèvement d'organes • Établissement recevant l'organe transféré • Plan de suivi à long terme établi • Identificateur du receveur dans le Registre canadien de transplantation	Supprimé
	• Donneur vivant transféré • Programme de don vivant duquel le donneur a été transféré	Ajouté

Remarque
Les éléments de données suivants ont été déplacés de l'étape 1 à l'étape 2 : Profil HLA A, Profil HLA B, Profil HLA C, Profil HLA DR, Profil HLA DQ, Profil HLA DP et Donneur de la liste de distribution exceptionnelle.

Fichier minimal sur les dons de personnes vivantes, version 1.4.1

Étape 1 Orientation du donneur vivant

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.1	Date de l'auto-orientation au programme de don vivant	La date de la première demande soumise par le donneur au programme de don vivant	AAAAMMJJ
1.2	Programme de don vivant	Le programme de don vivant responsable de la gestion du cas du donneur	Remarque : Les valeurs s'appuient sur l'index organisationnel de l'ICIS.
1.3	Identifcateur du donneur attribué par le programme de don vivant	Le numéro d'identifcation unique attribué au donneur par le programme de don vivant	Convention de désignation utilisée par le programme de don vivant
1.4	Numéro d'assurance maladie du donneur	Le numéro d'assurance maladie (NAM) provincial ou territorial du donneur (requis pour le couplage de données)	Numéro conforme à la convention provinciale ou territoriale sur l'attribution du NAM

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
1.9	Identité de genre	La catégorie assignée selon les rôles, les comportements, les expressions et les identités construits socialement SRXU OHV ¿OOHV OHV IHPPHV OHV JDUoRQV les hommes et les personnes de diverses identités de genre au sein d’une société donnée, et à laquelle OHXU RQ QH UHFRQQDLW SDV G¶LGHQWLWp GH JHQUH	• F : Féminin • M : Masculin • X : Autre genre • UNK : Inconnu • NA : Sans objet Remarque : Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7, à l’exception du code Autre genre, qui provient du MDRI.
1.10	Province ou territoire de résidence du donneur	La province ou le territoire correspondant à l’adresse du donneur, s’il habite au Canada	• AB : Alberta • BC : Colombie-Britannique • MB : Manitoba • NB : Nouveau-Brunswick • NL : T

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
1.12	Pays du donneur	Le pays où habite le donneur	Voir la liste à l’annexe B Autres valeurs : • OTH : Autre • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent des normes HL7 et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
1.13	Date d’entrée en vigueur des données démographiques sur le donneur	La date associée aux éléments Numéro d’assurance maladie du donneur, Autorité émettrice du numéro d’assurance maladie du donneur, Nom de famille du donneur (partiel), Province ou territoire de résidence du donneur, Code postal du donneur et/ou Pays du donneur	AAAAMMJJ

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.14	Groupe racialisé	L'origine raciale du donneur (telle que déclarée par le donneur)	Groupe (exemples) • 413464008 : Noir(e) (personne d'ascendance africaine, afro-caribéenne, afro-canadienne) • 26621000087107 : Asiatique de l'Est (personne d'ascendance chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise) • 26631000087109 : Autochtone (personne d'ascendance des Premières Nations, métisse, inuite) • 26641000087103 : Latino-américain(e) (personne d'ascendance

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.15	Identité autochtone	L'identité autochtone du donneur (membre des Premières Nations, Métis ou Inuk/Inuit), tel que le donneur l'exprime	• 29921000087109 : Premières Nations • 29931000087106 : Inuk/Inuit • 29941000087100 : Métis • 1 1RQ OD SHUVRQQH QH V¶LGHQWLI¿H SDV FRPPH des Premières Nations, Métis ou Inuk/Inuit) • ASKD : Préfère ne pas répondre (la personne a refusé de répondre) • ASKU : Ne sait pas (la personne ne connaît pas son identité autochtone) • NASK : La question n'a pas été posée Remarque : L'ensemble de valeurs provient du MDRI et de l'édition canadienne de la SNOMED CT. La sélection d'identités multiples permet d'indiquer une identité autochtone mixte.
1.16	Organe consenti pour le don	Organe dont le donneur accepte de faire don	• BOW : Intestins • KDD : Rein • LUB : Poumon • LVR : Foie • PAN : Pancréas Remarque : Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent du MDRI.
1.17	Taille du donneur	La taille du donneur en centimètres (conversion : 1	

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.19	Groupe sanguin du donneur	Le groupe sanguin du donneur, tel qu'il a été confirmé	• 112144000 : groupe sanguin A • 112149005 : groupe sanguin B • 58460004 : groupe sanguin O • 165743006 : groupe sanguin AB • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT. Le code UNK provient de la norme HL7.
1.20	Date de la décision concernant l'évaluation en vue du don d'organe	La date à laquelle la décision concernant l'évaluation du donneur vivant potentiel a été prise	AAAAMMJJ
1.21	État de la décision concernant l'évaluation en vue du don d'organe	L'état de la décision concernant l'évaluation du donneur vivant potentiel	• Y : Oui (l'évaluation du donneur sera effectuée) •

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
1.22	Raison de ne pas procéder à l'évaluation en vue du don d'organe	La principale raison pour laquelle le donneur ne fera pas l'objet d'une évaluation	• 1 : Âge • 2 : Incompatibilité ABO • 3 : Taille incompatible • 4 : Résultat positif à l'épreuve de compatibilité croisée • 5 : Décision du donneur vivant de ne pas aller de l'avant avec la transplantation • 6 : Hésitation de la part du donneur vivant • 7 : Donneur vivant décédé • 8 : Impossibilité de joindre le donneur vivant • 9 : Transfert du donneur vivant vers un autre centre • 10 : Autre donneur choisi • 11 : Orientation précoce (le receveur n'a pas encore été orienté ou n'est pas encore un candidat à la transplantation) • 12 : Raisons financières • 13 : Inapte au don — psychosocial • 14 : Non-observance des directives médicales • 15 : Usage de substances • 16 : Tabagisme • 17 : Indice de masse corporelle (IMC) • 18 : Inapte au don — autres raisons médicales • 19 : Raisons liées au receveur — autre • 20 : Bris de la chaîne de dons • OTH : Autre • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7.

Étape 2 Gestion du don de donneur vivant

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.1	Type de don	Le type de don coordonné	• 44861000087105 : donneur vivant — don dirigé • 44941000087103 : donneur vivant — donneur sans receveur prévu • 44891000087102 : donneur vivant — don croisé **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.2	Donneur de la liste de distribution exceptionnelle	Les antécédents médicaux ou le comportement social du donneur indiquent un risque accru de transmission d'une maladie au receveur	• Y : Oui • N : Non • UNK : Inconnu **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (donneur de la liste de distribution exceptionnelle : 34421000087104). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
2.3	Relation entre le donneur et le receveur — type	Indique s'il existe un lien biologique entre le donneur et le receveur	• Y : Oui • N : Non **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
2.4	Relation entre le donneur et le receveur — lien biologique	Le lien biologique entre le donneur et le receveur	• 13646006 : parent biologique • 82101005 : frère ou sœur biologique • 75226009 : enfant biologique • OTH : Autre **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT; le code OTH provient de la norme HL7.

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
2.5	Relation entre le donneur et le receveur — lien non biologique	Le lien non biologique entre le donneur et le receveur	• 262043009 : partenaire dans une relation • 45021000087107 : donneur vivant anonyme • 45031000087109 : donneur domino • 45051000087100 : donneur jumelé • OTH : Autre **Remarque :** Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.9	Détection de l'anticorps du cytomégalovirus	Indique si le résultat le plus récent du donneur au test de détection de l'anticorps du cytomégalovirus (CMV) était positif avant la décision relative au don d'organe ou la chirurgie de prélèvement	• 10828004 : positif • 260385009 : négatif • 373121007 : test non effectué • 373068000 : indéterminé **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (détection de l'anticorps du cytomégalovirus : 30200007). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.10	Sérologie du virus d'Epstein-Barr	Indique si le résultat le plus récent du donneur au test de détection de l'anticorps du virus d'Epstein-Barr était positif avant la décision relative au don d'organe ou la chirurgie de prélèvement	• 10828004 : positif • 260385009 : négatif • 373121007 : test non effectué • 373068000 : indéterminé **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (sérologie du virus d'Epstein-Barr : 408219003). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.11	Détection de l'antigène de surface de l'hépatite B	Indique si le résultat le plus récent du donneur au test de détection de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B (Ag HBs) était positif avant la décision relative au don d'organe ou la chirurgie de prélèvement	• 10828004 : positif • 260385009 : négatif • 373121007 : test non effectué • 373068000 : indéterminé **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (détection de l'antigène de surface de l'hépatite B : 47758006). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.12	Détection de l'anticorps du virus de l'hépatite B	Indique si le résultat le plus récent du donneur au test de détection de l'anticorps du virus de l'hépatite B (Ac anti-HBc) était positif avant la décision relative au don d'organe ou la chirurgie de prélèvement	• 10828004 : positif • 260385009 : négatif • 373121007 : test non effectué • 373068000 : indéterminé **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (détection de l'anticorps du virus de l'hépatite B : 59582004). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.13	Détection de l'anticorps de l'hépatite C	Indique si le résultat le plus récent du donneur au test de détection de l'anticorps du virus de l'hépatite C était positif avant la décision relative au don d'organe ou la chirurgie de prélèvement	• 10828004 : positif • 260385009 : négatif • 373121007 : test non effectué • 373068000 : indéterminé **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT (détection de l'anticorps de l'hépatite C : 64411004). Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT.
2.14	Profil HLA A	Les 2 types d'antigène leucocytaire humain (HLA) A du donneur	Voir l'annexe C pour la liste des spécificités sérologiques reconnues de l'antigène HLA Autres valeurs : • 37501000087101 : typage de l'antigène leucocytaire humain — pas d'antigène identifié • UNK : Inconnu/non disponible/typage non effectué • OTH : Autre **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (loci HLA-A [type] : 38548-4). Le code de l'ensemble de valeurs provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.15	Profl HLA B	Les 2 types d'antigène HLA B du donneur	Voir l'annexe C pour la liste des spécifcités sérologiques reconnues de l'antigène HLA Autres valeurs : • 37501000087101 : typage de l'antigène leucocytaire humain — pas d'antigène identifé • UNK : Inconnu/non disponible/typage non efectué • OTH : Autre **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (loci HLA-B [type] : 38546-8). Le code de l'ensemble de valeurs provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.
2.16	Profl HLA C	Les 2 types d'antigène HLA C du donneur	Voir l'annexe C pour la liste des spécifcités sérologiques reconnues de l'antigène HLA Autres valeurs : • 37501000087101 : typage de l'antigène leucocytaire humain — pas d'antigène identifé • UNK : Inconnu/non disponible/typage non efectué • OTH : Autre **Remarque :** Le code de l'élément de données provient de la terminologie LOINC (loci HLA-C [type] : 13302-5). Le code de l'ensemble de valeurs provient de l'édition canadienne de la SNOMED CT; les codes UNK et OTH proviennent de la norme HL7.

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
2.17	Profl HLA DR		

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.19	Profl HLA DP	Les 2 types d'antigène HLA DP du donneur	Voir l'annexe CeJSLTeXaHgVg-UaHgFg(eQQXa5 Tm[(t639BMC0 La ou0Q8dates aux)]TlQ8l.4ca

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
2.21			

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.22	Date(s) de fn de la mise en attente	La ou les dates auxquelles l'état « en attente » a été retiré du cas du donneur	AAAAMMJJ
2.23	Date d'inscription au programme de don croisé de rein	La date à laquelle le donneur a été inscrit au programme de don croisé de rein	AAAAMMJJ
2.24	Date de retrait du programme de don croisé de rein	La date à laquelle le donneur a été retiré du programme de don croisé de rein	AAAAMMJJ
2.25	Décision relative au don d'organe	Indique si le donneur est jugé apte à la chirurgie (sur le plan médical, physique, psychologique, etc.) par l'équipe de soins	• Y : Oui • N : Non **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
2.26	Date de la décision relative au don d'organe	La date à laquelle il a été décidé de procéder au don d'organe	AAAAMMJJ

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
2.29	Raison pour laquelle la chirurgie de prélèvement n'a pas eu lieu	Pour les donneurs qui ont été jugés aptes au don, mais n'ont pas procédé au don, la raison pour laquelle la chirurgie de prélèvement n'a pas eu lieu	• 1 : Le donneur vivant s'est retiré du processus • 2 : Donneur vivant décédé • 3 : Impossibilité de joindre le donneur vivant • 4 : Impossibilité de joindre le receveur • 5 : Receveur décédé • 6 : Receveur non admissible à une transplantation • 7 : Logistique de l'équipe/de l'hôpital (questions relatives aux ressources de l'équipe ou de l'hôpital) • 8 : Organe jugé inapproprié pour la transplantation • OTH : Autre • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7.

Étape 3 Chirurgie de don d'organe

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.1	Donneur vivant transféré	Indique si le donneur vivant a été transféré en vue du prélèvement de son organe après l'évaluation	• Y : Oui • N : Non **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.2	Programme de don vivant duquel le donneur a été transféré	Le centre de transplantation où a précédemment eu lieu l'évaluation du donneur	**Remarque :** Les valeurs s'appuient sur l'index organisationnel de l'ICIS.
3.3	Date d'admission	La date à laquelle le donneur a été admis à l'hôpital pour la chirurgie de prélèvement d'organe	AAAAMMJJ

Numéro	Nom de l’élément de données	Description	Valeurs valides
3.4	e W D E O L V V H P H Q W D \ D O ‘établissement où le prélèvement d’organe	L’établissement où le prélèvement d’organe a eu lieu	Remarque : Les valeurs s’appuient sur l’index organisationnel de l’ICIS.
3.7	Date du clampage chez le donneur	La date du clampage de la crosse aortique du donneur	AAAAMMJJ
3.8	Heure du clampage chez le donneur	L’heure du clampage de la crosse aortique du donneur	HHMM Remarque : Système horaire de 24 heures
3.9	Type de chirurgie	Le type de chirurgie réalisée	• 73632009 : laparoscopie • 47021000146101 : laparoscopie convertie en approche ouverte • 51101000087104 : laparoscopie assistée manuellement • 51111000087102 : laparoscopie assistée manuellement convertie en approche ouverte • 51121000087105 : chirurgie par voie ouverte avec petite incision • 51131000087107 : chirurgie par voie ouverte avec petite incision sous-costale • OTH : Autre Remarque : Les codes de l’ensemble de valeurs proviennent de l’édition canadienne de la SNOMED CT; le code OTH provient de la norme HL7.
3.10	Date du prélèvement d’organe	La date à laquelle l’organe a été prélevé	AAAAMMJJ

Numéro	Nom de l'élément de données	DescripAt0	Valeurs valides
3.12	Organe prélevé	L'organe offert que l'on compte prélever chez le donneur	• BOW • KDL • KDR • LBL • LLU • RLL • RML • RUL • LLL • LRL • LLS • LMS • PAI • PAS Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent
3.13	État du dispositif de perfusion	Indique si un dispositif de perfusion a	•

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.22	Date de sortie	La date à laquelle le donneur a obtenu son congé de l'hôpital	AAAAMMJJ
3.23	Centre de transplantation du receveur	Le centre de transplantation responsable de la gestion de cas du receveur	**Remarque :** Les valeurs s'appuient sur l'index organisationnel de l'ICIS.
3.24	Numéro d'assurance maladie du receveur	Le NAM provincial ou territorial du receveur (requis pour le couplage de données)	Numéro conforme à la convention provinciale ou territoriale sur l'attribution du NAM
3.25	Autorité émettrice du numéro d'assurance maladie du receveur	La province ou le territoire qui a émis le NAM du receveur	• AB : Alberta • BC : Colombie-Britannique • MB : Manitoba • NB : Nouveau-Brunswick • NL

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
3.27	État de la transplantation	Indique si la transplantation a eu lieu	• Y : Oui • N : Non **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs proviennent de la norme HL7.
3.28	Raison de la non-transplantation	La raison pour laquelle l'organe mentionné n'a pas été transplanté sur un receveur	• 1 : Organe jugé non approprié pour la transplantation • 2 : Problèmes liés au receveur • 3 : Complications chirurgicales (problème de sécurité) • OTH : Autre • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7.

Étape 4 Suivi du donneur vivant

Numéro	Nom de l'élément de données	Description	Valeurs valides
4.1	Date du décès	La date de la déclaration du décès du donneur	AAAAMMJJ
4.2	Cause du décès après le don	La lésion ou la maladie qui a constitué la cause immédiate du décès du donneur	Voir la liste à l'annexe D • Autres valeurs • OTH : Autre • UNK : Inconnu **Remarque :** Les codes OTH et UNK proviennent de la norme HL7.
4.3	Date de la perte de contact	La date à laquelle l'équipe de soins du donneur a perdu le contact avec le donneur après le don	AAAAMMJJ
4.4	Raison de la perte de contact	La raison pour laquelle le contact avec le donneur a été perdu	• 1 : Ne répond pas/ne souhaite pas continuer le suivi • 184081006 : le patient a déménagé • 50941000087106 : coordonnées non à jour • 419099009 : décédé • OTH : Autre **Remarque :** Les codes de l'ensemble de valeurs 184081006, 50941000087106 et 419099009 proviennent de l'édition canadienne de la SNOMED CT. Le code OTH provient de la norme HL7.
4.5	Date de début de l'insu f sance rénale	La date à laquelle une insu f sance rénale terminale s'est développée chez le donneur après le don de rein (débit de f ltration glomérulaire du donneur inférieur à 15 mL/min)	AAAAMMJJ

Annexes

Annexe A : Processus de don d’organes de personnes vivantes

La fgure suivante montre le cheminement général optimal pour le don d’organes de personnes vivantes. Ce processus a été validé auprès des représentants des centres de transplantation faisant partie du Forum consultatif d’experts opérationnels sur la gestion des données du projet ICIS-Inforoute sur les DOT (février 2022).

Annexe B : Codes des pays

Le tableau ci-dessous fournit une liste des codes de pays pour l’élément de données 1.12 (Pays du donneur). Cette liste de sélection des codes de pays normalisés élaborée par l’ICIS est un sous-ensemble de la norme ISO 3166-1 actuelle. Elle comprend 249 codes de pays uniques pertinents pour le Canada, y compris 2 autres codes de pays de Statistique Canada — Kosovo (XKO) et Sercq (XSQ)

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
IDN	Indonesia	Indonésie
IRN	Iran	Iran
IRQ	Iraq	Iraq
IRL	Ireland	Irlande
IMN	Isle of Man	Île de Man
ISR	Israel	Israël
ITA	Italy	Italie
JAM	Jamaica	Jamaïque
JPN	Japan	Japon
JEY	Jersey	Jersey
JOR	Jordan	Jordanie
KAZ	Kazakhstan	Kazakhstan
KEN	Kenya	Kenya
KIR	Kiribati	Kiribati
PRK	Korea, North	Corée du Nord
KOR	Korea, South	Corée du Sud
XKO	Kosovo	Kosovo
KWT	Kuwait	Koweït
KGZ	Kyrgyzstan	Kirghizistan
LAO	Laos	Laos
LVA	Latvia	Lettonie
LBN	Lebanon	Liban
LSO	Lesotho	Lesotho
LBR	Liberia	Libéria
LBY	Libya	Libye
LIE	Liechtenstein	Liechtenstein
LTU	Lithuania	Lituanie
LUX	Luxembourg	Luxembourg
MAC	Macao	Macao
MKD	Macedonia, Republic of	Macédoine, République de
MDG	Madagascar	Madagascar
MWI	Malawi	Malawi
MYS	Malaysia	Malaisie
MDV	Maldives	Maldives
MLI	Mali	Mali
MLT	Malta	Malte
MHL	Marshall Islands	Marshall, Îles
MTQ	Martinique	Martinique

Code de 3 lettres	Nom abrégé en anglais	Nom abrégé en français
SYR	Syria	Syrie
TWN	Taiwan	Taïwan
TJK	Tajikistan	Tadjikistan
TZA	Tanzania	Tanzanie
THA	Thailand	Thaïlande
TLS	Timor-Leste	Timor-Leste
TGO	Togo	Togo
TKL	Tokelau	Tokélaou
TON	Tonga	Tonga
TTO	Trinidad and Tobago	Trinité-et-Tobago
TUN	Tunisia	Tunisie
TUR	Turkey	Turquie
TKM	Turkmenistan	Turkménistan
TCA	Turks and Caicos Islands	Turks-et-Caïcos, Îles
TUV	Tuvalu	Tuvalu
UGA	Uganda	Ouganda
UKR	Ukraine	Ukraine
ARE	United Arab Emirates	Émirats arabes unis
GBR	United Kingdom	Royaume-Uni
USA	United States	États-Unis
UMI	United States Minor Outlying Islands	Îles mineures éloignées des États-Unis
URY	Uruguay	Uruguay
UZB	Uzbekistan	Ouzbékistan
VUT	Vanuatu	Vanuatu
VEN	Venezuela	Venezuela
VNM	Viet Nam	Viet Nam
VGB	Virgin Islands, British	Vierges britanniques, Îles
VIRUzbekistan		

Annexe D : Valeurs pour la cause du décès après le don

Vous trouverez dans le tableau qui suit la liste des valeurs pour l’élément de données 4.2 (Cause du décès après le don). Ces valeurs servent à décrire la lésion ou la maladie qui a mené au décès du donneur. Elles ont été adaptées à partir du Registre canadien des insu f sances et des transplantations d’organes (RCITO).

Groupe	Valeurs valides
Accident	1 : Accident en rapport avec le traitement
	2 : Accident sans rapport avec le traitement
Maladie cardiaque	3 : Arrêt cardiaque de cause inconnue
	4 : Surcharge liquidienne
	5 : Péricardite hémorragique
	6 : Hyperkaliémie
	7 : Cardiopathie hypertensive
	8 : Hypokaliémie
	9 : Ischémie myocardique ou infarctus
	10 : Autres causes d’insu f sance cardiaque
Maladie gastro-intestinale	11 : Gastro-entérite aiguë avec déshydratation
	12 : Hémorragie gastro-intestinale
	13 : Tumeur gastro-intestinale avec ou sans perforation
	14 : Infarctus mésentérique
	15 : Pancréatite
	16 : Perforation du côlon ou de l’intestin grêle
	17 : Perforation d’ulcère gastro-duodénal
	18 : Sclérose (ou adhérence) péritonéale
Hématologique	19 : Hypoplasie médullaire
	20 : Thrombocytopénie
	21 : Thrombose

Groupe	Valeurs valides
Infection	22 : Infection (coronavirus) 23 : Cytomégalovirus 24 : Virus d’Epstein-Barr 25 : Infection virale généralisée 26 : Infection (fongique) 27 : Infection (virale) 28 : Infection (bactérienne) 29 : Infections ailleurs (sauf hépatite virale) 30 : Péritonite (pas sclérose [ou adhérence] péritonéale) 31 : Pneumonie à Pneumocystis carinii 32 : Protozoose/infection parasitaire (y compris toxoplasmose)

Annexe E : Glossaire

Terme	Description
CanDOT	Système canadien de données sur les dons d'organes et les transplantations
IMC	Indice de masse corporelle
ICIS	Institut canadien d'information sur la santé
RCITO	Registre canadien des insu f sances et des transplantations d'organes
MDRI	Modèle de données de référence de l'ICIS
NAM	Numéro d'assurance maladie
HLA	Antigène leucocytaire humain
HL7	Norme Health Level Seven
ISO	Organisation internationale de normalisation
DPV	Dons de personnes vivantes
Fichier minimal sur les DPV	Fichier minimal sur les dons de personnes vivantes
LOINC	Logical Observation Identi f ers Names and Codes
DOT	Dons d'organes et transplantations
Collaboration	Collaboration en matière de dons et de gre f es d'organes
SNOMED CT	Nomenclature systématique de la médecine — termes cliniques
UCUM	Uni f ed Code for Units of Measure

Annexe F : Texte de remplacement pour la figure

Figure Processus de don d’organes de personnes vivantes

Cette figure illustre au niveau le plus global les tâches les plus importantes réalisées pendant le processus de transplantation et de don de personne vivante.

Le diagramme est composé de 2 « couloirs ». Le premier couloir représente un programme de transplantations et le deuxième, un programme de don vivant.

Le parcours de receveur commence au moment où un patient ayant une insuffisance organique et répondant aux critères d’orientation en vue d’une transplantation est orienté vers un programme de transplantations.

Le personnel du programme de transplantations effectue une évaluation et fournit de l’information à tous les patients orientés qui sont acceptés par le programme.

Une fois le patient approuvé pour la transplantation, il est inscrit comme admissible à un don d’organe d’une personne vivante.

Le personnel du programme de transplantations examine les renseignements sur le receveur et le donneur vivant pour déterminer s’il y a compatibilité.

Si le donneur vivant n’est pas compatible, d’autres options peuvent être envisagées (p. ex. programme de don croisé de rein, incompatibilité ABO)

Si le donneur vivant est compatible ou si une compatibilité est trouvée autrement (p. ex. programme de don croisé de rein, incompatibilité ABO), la transplantation est planifée (la chirurgie est inscrite à l’horaire, la salle d’opération est réservée, le patient est hospitalisé, etc.).

Une fois la planification de la transplantation terminée, la chirurgie a lieu.

Après la transplantation, des soins postopératoires et de rétablissement sont prodigués au receveur, qui reçoit ensuite son congé de l’hôpital.

Après la sortie du receveur, des soins postopératoires et de suivi à long terme lui seront fournis.

Le parcours de donneur vivant commence lorsqu’une personne communique d’elle-même avec le programme de transplantations pour faire part de son désir de donner un organe.

Bibliographie

BC Transplant. Page Web sur le don vivant de BC Transplant. Consulté en août 2021.

Société canadienne du sang. . 2016.

Société canadienne du sang. . 2015.

Société canadienne du sang. . 2015.

Société canadienne du sang. . 2015.

Société canadienne du sang.

Multi-Organ Transplant Program of Atlantic Canada (MOTP). Site Web du Multi-Organ Transplant Program of Atlantic Canada. Consulté en septembre 2021.

Robinson J, Barker DJ, Georgiou X, Cooper MA, Flicek P, Marsh SGE. IPD-IMGT/HLA Database. . Janvier 2020.

Scientifc Registry of Transplant Recipients (SRTR). About SRTR Reports. Consulté en novembre 2020.

Transplant Manitoba. . 2016.

Transplant Québec. Site Web de Transplant Québec. Consulté en février 2021.

Réseau Trillium pour le don de vie. Site Web du Réseau Trillium pour le don de vie. Consulté en mars 2021.

United Network for 1 Tc1o289 Tm[are1 338.15359n

aide@icis.ca

ICIS Ottawa
495, chemin Richmond
Bureau 600
Ottawa (Ont.)
K2A 4H6
613-241-7860

ICIS Toronto
4110, rue Yonge
Bureau 300
Toronto (Ont.)
M2P 2B7
416-481-2002

ICIS Victoria
880, rue Douglas
Bureau 600
Victoria (C.-B.)
V8W 2B7
250-220-4100

ICIS Montréal
1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 511
Montréal (Qc)
H3A 2R7
514-842-2226

icis.ca

51087-0424